

CATALOGUE
MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE
DES PRINCIPALES VARIÉTÉS
DE
POMMES DE TERRE

PAR

HENRY L. DE VILMORIN

Membre de la Société Nationale d'Agriculture

2^{me} ÉDITION

corrigée et augmentée de plus de 200 variétés.

PARIS

CHEZ VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, 4.

1886

Tous droits réservés



Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from

This project is made possible by a grant from the Institute of Museum and Library Services as administered by the Pennsylvania Department of Education through the Office of Commonwealth Libraries

CATALOGUE
MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE
DES PRINCIPALES VARIÉTÉS
DE
POMMES DE TERRE

PAR
HENRY L. DE VILMORIN

Membre de la Société Nationale d'Agriculture

2^{me} ÉDITION

corrigée et augmentée de plus de 200 variétés.

PARIS

CHEZ VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, 4.

1886

En présentant au public cette SECONDE ÉDITION de mon CATALOGUE SYNONYMIQUE DE POMMES DE TERRE, je puis en toute vérité la dire, suivant la phrase consacrée, *revue, corrigée et considérablement augmentée*. Pendant les quatre années qui se sont écoulées depuis la publication de mon travail, la collection a été en effet cultivée comparativement et étudiée de près chaque été; quelques erreurs de classement ont été reconnues et rectifiées : la pomme de terre CHAMPION, par exemple, indiquée à tort comme étant à germe rose dans la première édition, a été ramenée dans la 3^e section comme le demande son germe violet et son abondante floraison. Et surtout de très nombreuses variétés nouvelles ont été introduites, au moins cent vingt en tout, ce qui fait en moyenne plus de trente par année.

Ces nouveautés sont surtout d'origine anglaise, allemande ou américaine. Peu de Français se livrent aux semis de pommes de terre, ou au moins le font avec un succès qui les engage à faire connaître et à mettre dans le commerce les gains qu'ils obtiennent. Il en va tout autrement dans les pays étrangers.

En Angleterre, une association indépendante, qui s'est formée en vue de favoriser l'étude et l'amélioration de la pomme de terre, a exercé dans ces dernières années une influence très considérable et très heureuse. Elle a agi surtout par l'attrait de primes et de diplômes donnés tant à l'occasion d'une exposition annuelle qu'à la suite d'essais de culture. La Société Royale d'Horticulture de Londres, qui s'est prêtée avec empressement à faire ces essais dans ses jardins de Chiswick, a pris actuellement la direction du mouvement et se substituera vraisemblablement à la Société dont il vient d'être question. Un programme fort bien tracé sert de guide aux semeurs, qui cherchent surtout les variétés vigoureuses, à tiges peu élevées, à tubercules gros, bien faits et farineux, le tout uni à une résistance aussi grande que possible à la maladie. Les résultats obtenus sont remarquables ;

quelques-unes des acquisitions les plus nouvelles détrôneront probablement, quand elles seront assez multipliées, la plupart des variétés anciennes ; CHANCELLOR, READING RUSSET, doivent être mentionnées parmi les meilleurs gains récents.

En Allemagne, la pomme de terre a été surtout considérée comme matière première des industries, féculerie et distillation. M. Paulsen, de Nassengrund, le plus grand et le plus heureux semeur allemand, a surtout cherché des variétés à grand produit : ALKOHOL, TROPHIME, ODIN, KORN-BLUME, JUNO, sont remarquables par leur fertilité et leur richesse en féculé. La régularité de forme des tubercules a été un peu trop sacrifiée à la valeur industrielle.

En Amérique, les efforts sont dirigés à peu près dans le même sens qu'en Angleterre, cependant la plupart des races nouvelles ont un caractère un peu particulier, participant du type EARLY ROSE. Le feuillage est ample et uni, les tubercules presque toujours oblongs. La résistance à la maladie laisse souvent à désirer.

Il ne paraît pas douteux que les variétés de pommes de terre n'aient une durée limitée, au moins en tant que fertilité. Il serait donc grandement à désirer que des semis fussent faits en France, en vue d'obtenir de nouvelles races répondant aux préférences du public français : plantes vigoureuses, plus fertiles en tubercules qu'en fanes, à tubercules bien faits, ronds ou en amande, non entaillés, à chair jaune, un peu ferme tout en étant farineuse. Il n'y a guère à signaler comme acquisitions méritantes de cet ordre que la MARJOLIN TÊTARD, déjà ancienne, et la JOSEPH RIGAULT. Si l'on n'y prend garde, il arrivera un moment où nos meilleures races, vieilles et fatiguées, ne pourront plus lutter avec les variétés nouvelles venant de l'étranger. Ce serait regrettable à plus d'un point de vue, et si l'on veut conjurer ce danger, il faut se mettre à l'œuvre sans perdre de temps.

Paris, Mars 1886.



INTRODUCTION

A LA PREMIÈRE ÉDITION

Le projet de classement des diverses variétés de pommes de terre que je me hasarde à publier aujourd'hui n'est ni parfait ni complet; c'est seulement ce que j'ai pu faire de moins mauvais après une dizaine d'années d'études suivies et consciencieuses.

Vouloir dresser une liste complète de toutes les variétés de pommes de terre qui ont paru, ce serait une entreprise formidable, lors même qu'on se bornerait à une simple énumération, mais si l'on cherche à en composer un tableau raisonné et synonymique, la chose devient tout bonnement impossible, car des centaines de variétés ont actuellement disparu, après une existence plus ou moins prolongée, sans qu'il en reste de description complète pouvant suppléer à l'impossibilité où l'on se trouve de les comparer avec les races nouvelles. Or, sans une comparaison attentive et prolongée, on ne peut faire de classement sérieux.

L'idée de ce travail m'a été donnée par la culture de la collection de pommes de terre réunie par la Société centrale d'Agriculture et confiée par elle à mon grand-père, puis à mon père.

Si l'on en excepte la seule année 1818 (1), cette collection,

(1) En 1818, elle a été cultivée dans le parc de Vitry, appartenant à M. le comte Du Bois.

formée en 1814 et 1815, n'a cessé d'être cultivée dans notre propriété de Verrières depuis 1815 jusqu'à présent. Tous les ans, elle s'augmente des variétés nouvelles qui peuvent être réunies, de toute provenance, et la culture de chaque variété n'est abandonnée que si cette variété est reconnue identique à une autre, ou si elle vient à disparaître par accident. Chaque année voit ainsi des introductions nouvelles et voit aussi des éliminations plus ou moins nombreuses.

Le classement de cette collection a toujours été fait, jusqu'en 1873, d'après la couleur et la forme des tubercules, sans qu'il fût tenu compte des caractères de végétation. On répartissait alors toutes les variétés en onze divisions ou sections, dont quelques-unes renfermaient jusqu'à cent vingt ou cent trente variétés, plus ou moins différentes entre elles.

Comme, vers la même époque, la collection s'augmentait tous les ans de vingt, trente et quelquefois cinquante variétés nouvelles, par suite de la mise au commerce d'un grand nombre de gains obtenus par les semeurs anglais et américains, j'ai été frappé de la difficulté que ce mode de classement opposait à la comparaison rapide et sûre des différentes variétés, tant anciennes que nouvelles. Si, en effet, on doit comparer attentivement une centaine d'individus donnés, pour prononcer sur leur identité ou leur diversité, en apprécier les différences ou les ressemblances, on ne peut le faire utilement qu'après les avoir répartis en groupes beaucoup moins nombreux, dont l'esprit et même le regard puissent embrasser tout l'ensemble à la fois. Voulant alors former dans le sein des anciennes divisions des groupes secondaires renfermant seulement un petit nombre de variétés bien voisines les unes des autres, j'ai dû chercher des caractères autres que ceux des tubercules, qui fussent communs à un certain nombre de variétés tout en n'appartenant pas aux autres variétés de la même division. Ces caractères devaient en même temps être constants et ne pas dépendre des saisons plus ou moins favorables ou des conditions variables de la culture. Je n'en ai pas trouvé qui

m'aient paru présenter autant de fixité que ceux qui se tirent des germes développés dans l'obscurité. Que les tubercules aient pris tout leur accroissement ou, au contraire, qu'ils soient restés petits et chétifs à l'excès, qu'ils aient ou non atteint leur complète maturité, qu'ils soient même sains ou malades, pourvu qu'il leur reste assez de vie pour commencer à végéter, les germes se développent toujours semblables à eux-mêmes, avec la même apparence et la même couleur dans une même variété (1), et cette apparence est souvent assez caractéristique pour permettre de déterminer sûrement une pomme de terre par la simple inspection du tubercule pourvu de son germe.

Après la couleur des germes, celle des fleurs m'a fourni un bon caractère secondaire de classement; je dis secondaire, parce que la floraison ne peut pas toujours être observée : une année défavorable, l'invasion précoce de la maladie, une température trop brûlante ou trop fraîche peuvent empêcher une pomme de terre de fleurir, tandis que le germe peut toujours être observé. En outre, le caractère tiré du germe permet presque toujours de mettre dès le moment de la plantation une pomme de terre à peu près à la place qui lui convient dans la collection, quitte à rectifier un peu plus tard ce classement d'après les caractères tirés de la fleur; cela fait souvent gagner un an pour la détermination exacte de la place qu'une variété nouvelle devra occuper.

Conservant donc, comme point de départ, les anciennes divisions fondées sur la couleur et la forme des tubercules (et dans une plante dont la partie utile est le tubercule, je n'en pouvais désirer de meilleures), je les ai partagées en sous-divisions ou sections, d'après les caractères fournis d'abord par les germes, ensuite par les fleurs. C'est ainsi que, de l'ancienne division des

(1) Ceci n'est complètement exact que des germes produits par des tubercules qui n'ont pas subi longuement l'influence de la lumière; dans le cas contraire, et quand le tubercule a verdi ou s'est bronzé par l'action des rayons lumineux, il s'y accumule une quantité de matière colorante qui passe en partie dans les germes et leur donne une teinte beaucoup plus foncée qu'à l'ordinaire.

pommes de terre *jaunes rondes*, j'ai fait mes six premières sections, toutes passablement nombreuses.

Comme il est inutile de multiplier les sections outre mesure, je n'ai subdivisé les anciens groupes que là où ils renfermaient trop de variétés pour qu'il fût facile de les comparer toutes entre elles. L'ancienne division des pommes de terre *blanches longues entaillées*, par exemple, a été conservée intacte, bien qu'elle renferme des variétés qui fleurissent et d'autres dont les boutons tombent régulièrement, parce qu'elle n'était pas assez nombreuse dans l'origine et qu'elle n'a pas été suffisamment grossie par les additions récentes pour ne pouvoir être aisément embrassée d'un coup d'œil. J'ai dû faire une division nouvelle, celle des *rouges aplaties*, pour y placer de nombreuses variétés, principalement des américaines, qui ne rentraient pas bien dans les anciennes divisions.

J'espère donc, tout en ne publiant aujourd'hui qu'un travail incomplet, fournir un cadre qui pourra servir un jour à une classification plus nombreuse : les divisions en sont fondées sur des caractères précis que tout observateur est en état de distinguer sûrement, de manière à placer, sans erreur possible, dans le groupe auquel elle appartient, toute pomme de terre dont il connaît le tubercule, le germe et le mode de floraison.

Pour rendre plus facile encore la comparaison des diverses variétés entre elles, je me suis attaché à grouper ensemble, dans l'intérieur de chaque section, toutes les variétés qui me paraissent présenter le plus d'analogie les unes avec les autres. Les caractères différentiels de ces petits groupes m'ont été fournis soit par les fleurs, là où il n'en était pas tenu compte pour l'établissement de la section elle-même, soit, dans le cas contraire, par le feuillage, les tiges, la présence ou l'absence des graines; enfin, par la précocité ou les dimensions mêmes de la plante, caractères qui prennent, quand ils sont constants, assez de valeur pour permettre d'apprécier de petites différences entre variétés dont les caractères plus importants sont reconnus identiques.

Le tableau publié ci-après comprend tout ce qui restait en 1872 de l'ancienne *École* de la Société centrale d'Agriculture et des additions qui y avaient été faites jusqu'à là : en tout, environ deux cent dix variétés. Le nombre aurait dû en être beaucoup plus grand si les ravages de la maladie n'avaient fait disparaître, depuis 1845 jusqu'en 1872, les deux tiers au moins des variétés qui composaient anciennement la collection ; les six cent trente autres variétés ont été introduites dans l'*École* depuis 1872 (1). Grâce au système de classement dont je viens d'expliquer le mécanisme, elles ont été rapidement mises chacune à la place qui lui convenait et l'identité d'un très grand nombre de ces nouveautés, soit entre elles, soit avec des variétés anciennes, a pu être reconnue souvent dès la première année.

J'ai essayé de donner à la liste des variétés qui composent une même section une disposition typographique permettant de juger au premier coup d'œil de l'importance pratique des différentes variétés, et en même temps de reconnaître quelles sont celles qui sont identiques entre elles et celles qui paraissent n'être que des modifications ou variations d'autres plantes plus anciennes ou mieux connues, ou plus fortement caractérisées. Une accolade réunit les noms que je considère comme étant certainement synonymes : le nom qui est placé en tête est celui de la variété que je continue à cultiver dans la collection ; c'est en général le nom sous lequel la variété a été reçue le plus anciennement ; quelquefois, c'est le nom le plus anciennement donné, lors même qu'il n'aurait été introduit que tardivement dans la collection ; quelquefois encore, c'est le nom le plus connu qui a été conservé, alors même qu'il y en a eu de plus anciens, s'ils sont tombés en désuétude ou si leur application présente la moindre incertitude.

Toutes les variétés dont les noms sont placés en tête de ligne sont celles que je considère comme distinctes, qu'elles soient ou

(1) Ces chiffres sont ceux de la présente (deuxième) édition ; dans la première ce tableau ne comprenait en tout que six cent vingt-quatre variétés.

non accompagnées de synonymes ; ces variétés sont, autant que possible, rapprochées les unes des autres et groupées suivant leur affinité naturelle. Les noms des formes qui me semblent se relier étroitement à d'autres variétés, sans leur être cependant reconnues identiques, au moins quant à présent, sont imprimés en lignes rentrées, à la suite du nom de la variété distincte à laquelle il convient de les rapporter. Enfin, j'ai voulu distinguer des autres, en les faisant imprimer en PETITES CAPITALES, le nom des variétés les plus intéressantes par l'ensemble de leurs qualités, ou les plus généralement répandues dans la culture. Dans la 6^e section, par exemple, on trouve au premier rang la pomme de terre JEANÉ ou VOSGIENNE, qui est une des plus répandues dans la grande culture d'une bonne partie de la France ; à son nom sont réunis par une accolade onze autres noms qui représentent des synonymes bien constatés ; ensuite viennent, en lignes rentrées, trois noms appartenant à des variétés que je erois extrêmement voisines de la JEANÉ, sans pouvoir cependant affirmer qu'elles lui sont identiques. On trouve ensuite vingt variétés qui sont distinctes, mais à deux desquelles (HENDERSON'S PROLIFIC et CHAMOIS) on peut rapporter, comme en étant extrêmement voisines, les variétés dont les noms suivent en lignes rentrées. Puis, on trouve la pomme de terre CHARDON, la plus répandue des variétés de grande culture avec douze synonymes et un quasi-synonyme en ligne rentrée ; enfin, terminant la section, les pommes de terre CANADIENNE et RICKMAKER, franchement distinctes des autres, quoique rentrant bien dans le cadre de la section (1). Cette disposition des noms est exactement celle dont mon père a fait usage dans son *Catalogue synonymique des Froments*, publié en 1850 ; elle a été généralement jugée si satisfaisante pour l'œil et pour l'intelligence que je n'ai eu pouvoir mieux faire que de l'adopter.

On remarquera que chaque nom de variété est accompagné du

(1) Ce passage a été modifié à la réimpression, le texte primitif se trouvant en désaccord avec la disposition nouvelle donnée à la 6^e section dans la présente édition.

nom de l'établissement public, de la maison de commerce ou du particulier de qui elle a été reçue, ainsi que de l'indication de l'année où elle est entrée dans la collection. Des choses fort différentes ont quelquefois été reçues sous le même nom; dans ce cas, chaque forme distincte est rapportée à sa section avec l'indication de sa provenance. Réciproquement, la même variété reçoit souvent différentes dénominations, comme on peut s'en convaincre par les listes parfois fort longues de synonymes qui suivent le nom principal. En général, ce sont les meilleures variétés qui ont le plus de synonymes.

Ce travail aurait certainement pu comprendre un plus grand nombre de variétés si j'avais tardé quelques années de plus à le publier; mais, d'autre part, les variétés nouvelles paraissent aujourd'hui en si grand nombre, et plusieurs d'entre elles semblent tendre à remplacer si complètement les anciennes qu'il m'a paru intéressant de faire connaître cet essai de classement avant qu'un grand nombre de variétés qui ont été longtemps populaires en France aient complètement disparu des cultures.

HENRY VILMORIN

Verrières, près Paris, 10 Décembre 1880.



LISTE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE

I. — JAUNES RONDES

SECTION 1

Tubercules jaunes, ronds, petits ou moyens.
Germes violets ou teintés de violet.
Fleurs lilas ou nulles.

| | |
|-----------------------------------|--|
| BONNE WILHELMINE. | <i>M. Ordinaire de la Colonge, 1815.</i> |
| Tige couchée | <i>Douai, 1815.</i> |
| De Howorst | <i>M. Ackermann, 1844.</i> |
| Ronde de Caracas | <i>Collection suédoise, 1867.</i> |
| Sucrée de Brunswick | <i>Id.</i> |
| Irish Apple | <i>Id.</i> |
| Ronde d'Alger | <i>Id.</i> |
| Jaune ronde pour primeur. | <i>Docteur Turrel, 1872.</i> |
| Louis d'or. | <i>Fr. von Gröling, 1873.</i> |
| Flour ball | <i>Courtois-Gérard, 1874.</i> |
| De neuf semaines. | <i>M. Pariselle, 1879.</i> |
| { Dalmahoy. | <i>Ireland and Thomson, 1878.</i> |
| { Round ash leaf. | <i>Th. Gibbs, 1882.</i> |
| Paterson's Albert. | <i>Collection suédoise, 1867.</i> |
| Chairman | <i>R. Dean, 1885.</i> |
| { Hétéroclite ronde. | <i>M. Foucard, 1833.</i> |
| { Naine hâtive. | <i>Angleterre, 1845.</i> |
| { Turner's Union | <i>Angleterre, 1873.</i> |
| { White Emperor | <i>Angleterre, 1879.</i> |

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| { | Précoc de Harvey | <i>Comte de Gourcy, 1842.</i> |
| { | Mairtens' early | <i>P. Lawson and Son, 1846.</i> |
| { | Handworth's prolific | <i>Angleterre, 1857.</i> |
| { | Early Sovereign | <i>Thorburn and C^o, 1870.</i> |
| { | De Champagne jaune | <i>M. Théveny, 1874.</i> |
| | Rector of Woodstock | <i>R. Dean, 1874.</i> |
| | Feltham white | <i>R. Dean, 1881.</i> |
| | Don of the day | <i>R. Dean, 1882.</i> |
| | Surprise | <i>Th. Gibbs, 1882.</i> |
| | Model | <i>R. Dean, 1876.</i> |
| | Fenn's Onward | <i>W. Gloede, 1873.</i> |
| | Early Perfection | <i>R. Dean, 1875.</i> |
| | Early Cottage | <i>Thorburn and C^o, 1871.</i> |
| { | Prolifique hâtive | <i>P. Lawson and Son, 1834.</i> |
| { | Peruvian | <i>P. Lawson and Son, 1841.</i> |
| { | Oxford | <i>Noble and Cooper, 1862.</i> |
| { | Anglaise à forcer | <i>Collection suédoise, 1867.</i> |
| { | Ross's early | <i>W. Gloede, 1873.</i> |
| { | Lubbenauer | <i>Fr. von Gröling, 1873.</i> |
| | Fruit à pain (Breadfruit) | <i>P. Lawson and Son, 1841.</i> |
| | Quebec's Profit | <i>P. Lawson and Son, 1846.</i> |
| | Smith's curly | <i>W. Porter, 1878.</i> |
| { | Fine peau | <i>Départ. des Ardennes, 1815.</i> |
| { | Philadelphie ou Limal | <i>M. Derooy, 1817.</i> |
| { | Américaine hâtive élevée | <i>P. Lawson and Son, 1834.</i> |
| { | Prince de Galles | <i>Id.</i> |
| { | Grise arrondie | <i>M. Verlot, 1874.</i> |
| { | Madame Périer | <i>M. Théveny, 1874.</i> |
| | Fine hâtive | <i>P. Lawson and Son, 1834.</i> |
| | Glenbervie | <i>W. Porter, 1879.</i> |
| | Goldelse | <i>A. Busch, 1885.</i> |
| | Standwell | <i>R. Dean, 1883.</i> |
| | London Hero | <i>R. Dean, 1885.</i> |

SECTION 2

Tubercules jaunes, ronds, moyens ou gros, yeux enfoncés.

Germes forts, jaune de cire, à pointe et base violettes.

Fleurs gris de lin, avortant presque toujours.

| | |
|--|---------------------------------------|
| SHAW (Chave) | <i>Angleterre, 1815.</i> |
| Guyrandienne | <i>M. Ramey, 1855.</i> |
| De neuf semaines | <i>M. Posth, 1856.</i> |
| Sancerre | <i>Société d'agriculture, 1850.</i> |
| De Varces | <i>M. Coche, 1869.</i> |
| Anglaise Erin's Queen | <i>M. Thierry-Colson, 1869.</i> |
| Patraque jaune | <i>M. Goussard de Mayolle, 1874.</i> |
| Châtillonnaise | <i>M. Théveny, 1874.</i> |
| Hâtive de Langres | <i>Id.</i> |
| Chanoy | <i>Id.</i> |
| Montagnarde | <i>Id.</i> |
| Royal George | <i>M. Thierry-Colson, 1874.</i> |
| Printanière de Beaune | <i>M. Théveny, 1875.</i> |
| Jaune de Chauvigny | <i>Id.</i> |
| De Valsère | <i>Id.</i> |
| Circassienne | <i>Id.</i> |
| Bourguignonne hâtive | <i>Id.</i> |
| Gaillefontaine | <i>Id.</i> |
| Hongroise | <i>Id.</i> |
| Patraque blanche | <i>Id.</i> |
| Ronde hâtive | <i>J. Mayeux, 1877.</i> |
| Cerdagne ronde | <i>M. Thévenot, 1878.</i> |
| Dalmahoy | <i>R. Dean, 1874.</i> |
| Printanière | <i>Antibes, 1881.</i> |
| Grosse jaune deuxième hâtive | <i>G. Darras, 1851.</i> |
| Docteur Bretonneau | <i>Docteur Bretonneau, 1853.</i> |
| La généreuse | <i>M. Dumont-Carment, 1858.</i> |
| JAUNE RONDE HATIVE | <i>Chevreuse, 1851.</i> |
| De trois mois | <i>Société d'acclimatation, 1866.</i> |
| Ronde de trois mois | <i>M. Rémy, 1874.</i> |
| D'août | <i>Compiègne, 1874.</i> |
| Jaune ronde demi-hâtive | <i>J. Mayeux, 1877.</i> |
| Riz de M. Colas | <i>Docteur Cénas, 1876.</i> |

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| { | SEGOZAC | <i>M. Morel de Vindé</i> , 1839. |
| { | Richard | <i>M. Gombart</i> , 1857. |
| { | Farineuse de Chartres | <i>Id.</i> |
| { | Jaune ronde | <i>M. Roussel</i> , 1864. |
| | Saint-Jean | <i>Marquis de Fayolle</i> , 1841. |
| | Sydowsauer | <i>Fr. von Gröling</i> , 1875. |
| { | Dunbar Regent | <i>R. Dean</i> , 1877. |
| { | D'Amérique | <i>R. Penmanec</i> , 1881. |
| | Gryffe castle seedling | <i>Rev. W. F. Rudclyffe</i> , 1870. |
| | Tarbesienne | <i>Docteur Cénas</i> , 1876. |
| | Des Pyrénées | <i>Id.</i> |
| | Regent | <i>Angleterre</i> , 1868. |
| | Mousson blanche | <i>M. Guesnet</i> , 1837. |
| | Yorkshire Regent | <i>Angleterre</i> , 1871. |
| { | Tanguy | <i>J. L. Soubigou</i> , 1862. |
| { | The Queen potato | <i>W. Gloede</i> , 1873. |
| { | Cockney | <i>Collection suédoise</i> , 1867. |
| { | British Queen | <i>W. Gloede</i> , 1873. |
| { | Arrondie de Beaune | <i>M. Théveny</i> , 1875. |
| { | Freebearer | <i>R. Dean</i> , 1874. |
| { | Grosse de Voiron | <i>M. Théveny</i> , 1874. |
| { | Fermière picarde | <i>M. Dumont-Carment</i> , 1858. |
| | Jaune ronde très hâtive | <i>M. de Kerpoisson</i> , 1883. |
| | Morville | <i>Baron d'Avène</i> , 1875. |

SECTION 3

Tubercules jaunes ou un peu saumonés, souvent méplats.

Germes violets.

Fleurs lilas ou violettes, presque toujours abondantes.

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| { | De Lesquin | <i>Départ. du Nord</i> , 1882. |
| { | SEGUIN | <i>M. Longavesne</i> , 1874. |
| { | Dévorante | <i>M. Théveny</i> , 1875. |
| { | Sainte-Hélène tardive | <i>M. Vavin</i> , 1876. |
| { | Des Cordillières | <i>Vandendriesse et Panis</i> , 1844. |
| { | Semis des Cordillières | <i>Potager de Versailles</i> , 1874. |
| | Hogg's Coldstream | <i>Angleterre</i> , 1868. |

LISTE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE.

3

| | |
|-------------------------------------|---|
| Early giant King | <i>A. Blay</i> , 1882. |
| Pride of the market | <i>R. Dean</i> , 1883. |
| { PATERSON'S VICTORIA | <i>Angleterre</i> , 1868. |
| { Mercerès d'Amérique | <i>Collection suédoise</i> , 1867. |
| { Improved Victoria | <i>A. Busch</i> , 1877. |
| { Victoria Regent | <i>Th. Gibbs</i> , 1882. |
| { Druid | <i>Id.</i> |
| Richter's Imperator | <i>A. Busch</i> , 1877. |
| Prime Minister | <i>R. Dean</i> , 1883. |
| Reading Hero | <i>R. Dean</i> , 1882. |
| Lerchen-Rose | <i>Fr. von Gröling</i> , 1879. |
| CHAMPION (Scotch Champion). | <i>M. de la Tréhouais</i> , 1879. |
| Scottish Queen | <i>Fotheringham and Wallace</i> , 1885. |

SECTION 4

Tubercules ronds, jaune pâle.

Germes blancs.

Fleurs nulles ou blanches.

| | |
|--|--|
| { Douce blanche | <i>M. Bezançon</i> , 1867. |
| { Ledoux | <i>M. Ledoux-Bonrat</i> , 1869. |
| { Belle Marianne | <i>Docteur Cénas</i> , 1876. |
| { Tarbesienne (germes blancs). | <i>Id.</i> |
| { Lord Mayor | <i>R. Dean</i> , 1883. |
| Purlie | <i>W. Porter</i> , 1879. |
| Early Dimmisk | <i>Soc. d'hort. de Londres</i> , 1877. |
| Lerchen-Kartoffel | <i>A. Busch</i> , 1877. |
| Diäta (<i>Paulsen</i>). | <i>F. Heine</i> , 1883. |
| Cyane (<i>Paulsen</i>) | <i>F. Heine</i> , 1883. |
| Grosse farineuse | <i>M. Chipier</i> , 1885. |

SECTION 5

Tubercules ronds ou légèrement allongés, jaune pâle.

Germe roses. — Fleurs blanches.

| | |
|---|---------------------------------------|
| Fenn's early market | <i>R. Dean, 1875.</i> |
| Sunrise. | <i>R. Dean, 1883.</i> |
| De Dracy-le-Fort. | <i>M. Fontaine, 1865.</i> |
| Early Cluster | <i>R. Dean, 1882.</i> |
| Châtillonnaise améliorée. | <i>M. Théveny, 1875.</i> |
| Lawson's Conqueror | <i>Comte de Gourcy, 1852.</i> |
| Duke of Albany | <i>R. Dean, 1883.</i> |
| Alderman. | <i>R. Dean, 1883.</i> |
| { Biscuit blanc | <i>Collection suédoise, 1867.</i> |
| { Gloire de Baltimore. | <i>Id.</i> |
| { Bisquit | <i>A. Buseh, 1877.</i> |
| { Hollandische Zucker | <i>F. Heine, 1883.</i> |
| { Frühe Zucker | <i>Id.</i> |
| Caillaud. | <i>Fontaine et Duflot, 1869.</i> |
| Porter's Excelsior | <i>R. Dean, 1876.</i> |
| Frühe Nassengrunder. | <i>W. Paulsen, 1882.</i> |
| Schoolmaster | <i>Soe. d'hort. de Londres, 1877.</i> |
| Harvester | <i>R. Dean, 1883.</i> |
| De Norwège. | <i>M. Rohart, 1869.</i> |
| Fillbasket | <i>R. Dean, 1882.</i> |
| Anderssen | <i>W. Paulsen, 1882.</i> |
| { Jaune d'Août | <i>Jemmapes, 1815.</i> |
| { Daubenton | <i>Semis Sageret, 1841.</i> |
| { De neuf semaines. | <i>M. Jullien, 1841.</i> |
| { Lothe. | <i>M. Moleux, 1866.</i> |
| { Hâtive des environs de Bruxelles. | <i>F. Van Celst, 1873.</i> |
| Sancerre. | <i>H. Caron, 1876.</i> |
| Intermedio | <i>Collection suédoise, 1867.</i> |
| Seed | <i>Fr. von Gröling, 1873.</i> |
| Tardive de Becker pour bestiaux | <i>Collection suédoise, 1867.</i> |
| Grande précoce de Montevideo. | <i>Collection suédoise, 1867.</i> |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Chardon améliorée | <i>MM. Peltier frères</i> , 1879. |
| Canada | <i>Paul Genay</i> , 1885. |
| Weisser Sieberhäuser | <i>Fr. von Gröling</i> , 1873. |
| Plentiful | <i>A. Busch</i> , 1885. |
| Fürst Bismarck | <i>F. Heine</i> , 1883. |
| Euphyllös | <i>W. Paulsen</i> , 1882. |
| VAN DER VEER | <i>Fr. von Gröling</i> , 1873. |
| Frémont | <i>A. Busch</i> , 1885. |
| Alkohol | <i>W. Paulsen</i> , 1882. |
| Blanchette | <i>A. Vauchelet</i> , 1882. |
| Jackson's white | <i>Bliss and Sons</i> , 1874. |
| Rustycot pink-eyed | <i>Bliss and Sons</i> , 1874. |

SECTION 6

Tubercules jaunes, gros, arrondis ou oblongs, plus ou moins entaillés; yeux profonds.
 Germes roses. — Fleurs abondantes, roses ou lilas.

| | |
|--|------------------------------------|
| JEANCÉ (Jeuzy; Juxière; Vosgienne) . . | <i>M. Parmentier</i> , 1855. |
| Blanche à fleur blanche | <i>M. Gérard</i> , 1838. |
| Grosse d'Amérique | <i>Collection suédoise</i> , 1867. |
| Américaine | <i>Id.</i> |
| Juxière améliorée | <i>M. Guénard</i> , 1869. |
| Brise-motte | <i>M. Rabœuf</i> , 1867. |
| Farinosa | <i>Collection suédoise</i> , 1867. |
| Des Allinges | <i>M. Théveny</i> , 1875. |
| Clairlieu | <i>Id.</i> |
| Des Vosges | <i>Id.</i> |
| La Lorraine | <i>J. Mayeux</i> , 1877. |
| Blanche Belmenane | <i>M. Petitmange</i> , 1885. |
| Des Ardennes | <i>M. Théveny</i> , 1875. |
| Erste von Nassengrund | <i>Fr. von Gröling</i> , 1873. |
| De Malte | <i>H. Rigault</i> , 1878. |
| Achilles | <i>W. Paulsen</i> , 1882. |
| Trophime | <i>W. Paulsen</i> , 1882. |
| Amarante (<i>Paulsen</i>) | <i>L.-J. Gathoye</i> , 1884. |
| Hermann (<i>Paulsen</i>) | <i>L.-J. Gathoye</i> , 1884. |
| Matador (<i>Paulsen</i>) | <i>L.-J. Gathoye</i> , 1884. |

| | |
|--|--|
| Henderson's prolific. | <i>Th. Gibbs</i> , 1882. |
| White Fortyfold | <i>Th. Gibbs</i> , 1882. |
| King Noble. | <i>A. Blay</i> , 1882. |
| Chamois | <i>Collection suédoise</i> , 1867. |
| { Bedford prolific | <i>R. Dean</i> , 1879. |
| { Hooper's round white. | <i>Th. Gibbs</i> , 1882. |
| Jaune ronde. | <i>Ecole Mathieu de Dombasle</i> , 1883. |
| Silverskin | <i>Bliss and Sons</i> , 1881. |
| Kusko | <i>F. Heine</i> , 1883. |
| Unfehlbare | <i>F. Heine</i> , 1883. |
| Standard | <i>Sutton and Sons</i> , 1882. |
| Président II | <i>R. Dean</i> , 1885. |
| The Doctor | <i>R. Dean</i> , 1885. |
| Gelbe rose | <i>W. Paulsen</i> , 1882. |
| Hertha | <i>W. Paulsen</i> , 1882. |
| Hortensie (<i>Paulsen</i>). | <i>F. Heine</i> , 1883. |
| Odin (<i>Paulsen</i>) | <i>F. Heine</i> , 1885. |
| Späte Dauer | <i>F. C. Heinemann</i> , 1880. |
| Harrison's n° II. | <i>Bliss and Sons</i> , 1874. |
| CHARDON (de Saxe. graine de Saxe). . . | <i>M. Dugrip</i> , 1855. |
| De Comice | <i>Bretagne</i> , 1874. |
| Montenaille tardivissime | <i>M. Théveny</i> , 1874. |
| Epinard. | <i>M. Boursier</i> , 1872. |
| Riesen Marmont | <i>A. Busch</i> , 1877. |
| Fosseuse | <i>Valogues</i> , 1876. |
| Infernale | <i>Id.</i> |
| Chardonne | <i>Id.</i> |
| Américaine blanche | <i>Baron de Beurnonville</i> , 1874. |
| D'Argentan | <i>M. Théveny</i> , 1875. |
| De Malesherbes | <i>Id.</i> |
| Mâconnaise | <i>Id.</i> |
| Des Pyrénées (germes roses). | <i>Docteur Cénas</i> , 1876. |
| Cerdagne jaune. | <i>M. Thévenot</i> , 1877. |
| Canadienne | <i>M. Thiberville</i> , 1878. |
| Rickmaker | <i>M. Boursier</i> , 1885. |

SECTION 7

Tubercules blancs ou jaune pâle, oblongs, aplatis, lisses.
 Germes blancs ou légèrement rosés.
 Fleurs blanches.

| | |
|--|----------------------------------|
| FLOCON DE NEIGE (Snowflake) | <i>Bliss and Sons, 1874.</i> |
| Marksman. | <i>Th. Gibbs, 1882.</i> |
| Ice cream. | <i>Th. Gibbs, 1882.</i> |
| Burbank's seedling. | <i>Th. Gibbs, 1882.</i> |
| Pride of America. | <i>Th. Gibbs, 1882.</i> |
| Early Mayflower. | <i>A. Busch, 1885.</i> |
| White Star | <i>Bliss and Sons, 1881.</i> |
| Snowball | <i>R. Dean, 1885.</i> |
| Richter's Edelstein | <i>F. C. Heinemann, 1880.</i> |
| Saint-Patrick | <i>J. Veitch and Sons, 1881.</i> |
| { BRESEE'S PROLIFIC | <i>Thorburn and Co, 1872.</i> |
| { Peeters | <i>M. Vincent, 1880.</i> |
| { Du château de Yermoloff. | <i>M. Caseneuve, 1883.</i> |
| { Jaune longue plate | <i>A. Bluy, 1882.</i> |
| Kopsel's frühe weisse Rosen-Kartoffel. | <i>Dippe frères, 1874.</i> |
| Kaiser-Kartoffel. | <i>Fr. von Gröling, 1877.</i> |
| Grange Bruyère. | <i>M. Chipier, 1885.</i> |
| Pride of Ontario. | <i>Th. Gibbs, 1882.</i> |
| Kaiser Wilhelm. | <i>F. Heine, 1883.</i> |
| { Bresee's Peerless. | <i>Thorburn and Co, 1872.</i> |
| { Mammoth Pearl | <i>Th. Gibbs, 1882.</i> |
| { Jackson Urbith. | <i>E. Lefort, 1882.</i> |
| Parisienne. | <i>M. Millet fils, 1882.</i> |
| Thorburn's Paragon | <i>R. Dean, 1876.</i> |
| Eureka | <i>Bliss and Sons, 1874.</i> |
| Brownell's Multiplier | <i>A. Busch, 1877.</i> |
| { Myatt's Coquette | <i>M. Verlot, 1874.</i> |
| { Renneville. | <i>M. Théveny, 1874.</i> |
| { Saucisse blanche | <i>Baron d'Arène, 1875.</i> |
| Oblongue de Malabry | <i>M. Limon, 1881.</i> |
| England's Pride | <i>M. Théveny, 1876.</i> |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Pringle | <i>W. Paulsen, 1882.</i> |
| Wiltshire Snowflake | <i>R. Dean, 1881.</i> |
| Chipier | <i>M. Chipier, 1885.</i> |
| Milky white | <i>W. Gloede, 1874.</i> |
| Early Gooderich | <i>Thorburn and C^o, 87</i> |
| Precious seedling | <i>M. Dantzer, 1879.</i> |
| Président | <i>R. Dean, 1873.</i> |
| Alpha | <i>Bliss and Sons, 1874.</i> |
| Covent Garden Perfection. | <i>R. Dean, 1879.</i> |
| Idaho. | <i>J. Wrench and Sons, 1875.</i> |
| Brownell's Success | <i>W. Porter, 1879.</i> |
| White Elephant | <i>Thorburn and C^o, 1881.</i> |
| American Magnum bonum | <i>Bliss and Sons, 1881.</i> |

Nota. — Cette section est en grande partie composée de variétés américaines, dont plusieurs ont les tubercules légèrement rosés et se rapprochent des variétés les plus pâles de la 23^e section.

SECTION 8

Tubercules jaunes ou saumonés, aplatis, lisses, ronds ou oblongs.
Germes roses. — Fleurs lilas.

| | |
|----------------------------------|--|
| Non such | <i>Bliss and Sons, 1874.</i> |
| Premier. | <i>W. Gloede, 1873.</i> |
| Early Climax | <i>Thorburn and C^o, 1872.</i> |
| Early Border | <i>R. Dean, 1883.</i> |
| Vermont Champion. | <i>Hooper and C^o, 1883.</i> |
| Brownell's Best | <i>F. Heine, 1883.</i> |
| King of the West. | <i>M. Théveny, 1876.</i> |
| Richter's Schneecrose. | <i>A. Busch, 1877.</i> |
| Richter's lange weisse | <i>F. Heine, 1883.</i> |
| { Wormleighton seedling. | <i>R. Dean, 1881.</i> |
| { Blanche longue | <i>Cat. de Vilmorin-Andrieux, 1884.</i> |

Nota. — Cette section se relie par une gradation presque insensible à la 24^e section composée principalement, comme elle, de variétés américaines.

II. — JAUNES LONGUES ENTAILLÉES

SECTION 9

Tubercules jaunes, allongés, entaillés.

Germes roses.

Fleurs nulles ou blanches.

| | |
|-------------------------------|---|
| { Imbriquée. | <i>Départ. des Ardennes, 1815.</i> |
| { Cantaloup pintans | <i>Soc. hortic. de Bruxelles, 1856.</i> |
| { Ananas longue | <i>P. Lawson and Son, 1834.</i> |
| { Ananas | <i>M. Théveny, 1875.</i> |
| { De Bristol | <i>Simon Louis frères, 1848.</i> |
| { Vitelotte jaune | <i>M. Bisson, 1873.</i> |
| { Vitelotte blanche | <i>M. Verlot, 1874.</i> |
| { Luxembourgeoise | <i>M. Théveny, 1875.</i> |
| Asperge | <i>Allemagne, 1872.</i> |
| Aspersie | <i>M. Carrière, 1880.</i> |
| Citronnelle | <i>M. Caron, 1876.</i> |

III. — JAUNES LONGUES LISSES

SECTION 10

Tubercules jaunes, lisses, en forme de rognon ou d'amande, ou bien simplement aplatis et oblongs.

Germes roses ou blancs.

Fleurs blanches ou nulles.

| | |
|--|-----------------------------------|
| { KIDNEY ou MARJOLIN | <i>Angleterre, 1815.</i> |
| Deux fois l'an | <i>V^e Thuau, 1864.</i> |
| Sandringham early kidney | <i>R. Dean, 1872.</i> |
| Sechswochen Kartoffel | <i>Fr. von Gröling, 1873.</i> |
| { Early walnut-leaved kidney | <i>R. Dean, 1873.</i> |
| De Combes | <i>M. Théveny, 1874.</i> |
| Quarantaine | <i>Halle de Paris, 1875.</i> |
| Pfluckmans | <i>W. Paulsen, 1882.</i> |
| A feuille de noyer | <i>Gavillot frères, 1884.</i> |
| { Mona's Pride | <i>W. Gloede, 1873.</i> |
| { The Shiner | <i>R. Dean, 1878.</i> |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| MARJOLIN TÊTARD | <i>H. Rigault, 1870.</i> |
| { A FEUILLE D'ORTIE | <i>M. Rémy, 1872.</i> |
| { Sutton's early Race horse | <i>Sutton and Sons, 1872.</i> |
| { Early Bedford kidney | <i>R. Dean, 1873.</i> |
| { Fouilleuse | <i>E. Forgeot, 1876.</i> |
| { La généreuse | <i>A. Morlot, 1876.</i> |
| Reine de mai | <i>Courtois-Gérard, 1872.</i> |
| Snowdrop | <i>R. Dean, 1883.</i> |

SECTION 11

Tubercules jaunes, longs, lisses, en rognon ou simplement aplatis.

Germes roses.

Fleurs roses ou lilas.

| | |
|---|------------------------------------|
| { Parmentière, Jaune longue de Hollande | <i>Halle de Paris, 1815.</i> |
| { Vilmorin | <i>M. Soulbieu, 1855.</i> |
| { Cornichon tardif | <i>M. Théveny, 1874.</i> |
| MARJOLIN TARDIVE | <i>M. Bazin, 1853.</i> |
| Quarantaine de Noisy | <i>Halle de Paris, 1859.</i> |
| Richesse | <i>Collection suédoise, 1867.</i> |
| Taylor's Yorkshire hybrid | <i>Rev. W. F. Radclyffe, 1870.</i> |
| Jaune longue de Brie | <i>Halle de Paris, 1873.</i> |
| Cornichon Langrois | <i>M. Théveny, 1874.</i> |
| { Beile de Vincennes | <i>M. Payot, 1874.</i> |
| { Suzel | <i>M. Théveny, 1875.</i> |
| Hollandaise, Quarantaine de Perthuis | <i>Vaucluse, 1876.</i> |
| Jaune longue d'Auvergne | <i>Halle de Paris, 1879.</i> |
| Napoléone | <i>M. Dubois, 1881.</i> |
| Quarantaine de Montreuil | <i>Id.</i> |
| Bonnemain | <i>Loise-Chauvière, 1875.</i> |
| Thurston's Conqueror | <i>Collection suédoise, 1867.</i> |
| Blanc de lait | <i>A. Blay, 1882.</i> |
| Pioneer | <i>R. Dean, 1877.</i> |
| Excellente naine | <i>M. Millet fils, 1882.</i> |
| Princesse | <i>Allemagne, 1872.</i> |
| Précieuse de Fitz-James | <i>A. Blay, 1882.</i> |
| Waterloo kidney | <i>R. Dean, 1873.</i> |
| Sutton's Magnum bonum | <i>R. Dean, 1876.</i> |

SECTION 12

Tubercules blancs ou jaune pâle, aplatis, allongés, presque toujours en amande ou en rognon.

Germes violets ou teintés de violet.

Fleurs blanches.

| | |
|---|-------------------------------------|
| LAPSTONE | <i>Angleterre</i> , 1868. |
| Rognon nain à forcer | <i>Collection suédoise</i> , 1867. |
| Cobbler's Lapstone true | <i>Rev. W. F. Radclyffe</i> , 1870. |
| Pebble white | <i>Id.</i> |
| Woppet's seedling | <i>Id.</i> |
| Yorkshire Hero | <i>Id.</i> |
| Ash top fluke | <i>W. Gloede</i> , 1873. |
| Marjolin Faure | <i>M. Théveny</i> , 1874. |
| Rixton's Pippin | <i>R. Dean</i> , 1875. |
| Perfection kidney | <i>Id.</i> |
| Hollandaise hâtive à œil bleu | <i>M. Pichot</i> , 1876. |
| Anglaise | <i>J. Mayeux</i> , 1877. |
| Improved ash top fluke | <i>W. Porter</i> , 1879. |
| Boulangère d'Irlande | <i>M. Morand</i> , 1881. |
| Uxlip seedling | <i>Richard Gilbert</i> , 1882. |
| Magnet | <i>J. Rigault</i> , 1885. |
| Sandy's seedling | <i>R. Dean</i> , 1885. |
| International kidney | <i>Nutting and Sons</i> , 1878. |
| Avalanche | <i>R. Dean</i> , 1879. |
| New Cambridge kidney | <i>R. Dean</i> , 1875. |
| Feinste kleine weisse Mandel | <i>A. Busch</i> , 1877. |
| Noisette Sainville | <i>M. de Sainville</i> , 1829. |
| Unwin's kidney | <i>M. Warner</i> , 1845. |
| Marjolin Burgeon | <i>M. Burgeon</i> , 1882. |
| Sutton's Berkshire kidney | <i>Sutton and Sons</i> , 1872. |
| Flukes | <i>Angleterre</i> , 1868. |
| Plate d'Amérique | <i>M. Verlot</i> , 1874. |
| Plate de Saout | <i>Bretagne</i> , 1874. |
| Plate | <i>Brest</i> , 1875. |
| Plate de Bretagne | <i>M. Leborgne</i> , 1881. |
| Plate blanche | <i>Le Carré et Kervello</i> , 1882. |
| Jaune longue plate | <i>Morlaix</i> , 1882. |
| Bonne blanche | <i>J. Rigault</i> , 1885. |

| | |
|--|------------------------------------|
| DAWES MATCHLESS | <i>R. Dean, 1873.</i> |
| Excelsior kidney. | <i>Id.</i> |
| Webb's Imperial. | <i>Angleterre, 1868.</i> |
| Bryanstone kidney early | <i>Rev. W. F. Radclyffe, 1870.</i> |
| Manning's kidney | <i>Sutton and Sons, 1872.</i> |
| England's Fair beauty. | <i>W. Gloede, 1873.</i> |
| Chagford kidney. | <i>R. Dean, 1873.</i> |
| Wormley kidney. | <i>Id.</i> |
| The Shiner | <i>R. Dean, 1874.</i> |
| Champion kidney | <i>W. Porter, 1879.</i> |
| Recorder | <i>R. Dean, 1883.</i> |
| Hornycroft's seedling var. fol | <i>Rev. W. F. Radclyffe, 1870.</i> |

SECTION 13

Tubercules jaunes, longs, aplatis, oblongs ou en forme de rognon.
 Germes violets. — Fleurs lilas ou violettes.

| | |
|--|----------------------------------|
| ROYAL ASH-LEAVED KIDNEY. | <i>Thomas Rivers, 1864.</i> |
| Early Alma kidney. | <i>Cooper and Bolton, 1864.</i> |
| Carter's early Race horse | <i>J. Carter and Co, 1865.</i> |
| Early Reliance | <i>Angleterre, 1868.</i> |
| Rivers' Royal ash-leaved kidney | <i>Angleterre, 1870.</i> |
| Veitch's improved early ash-leaved kidney. | <i>J. Veitch and Sons, 1872.</i> |
| Harry kidney | <i>R. Dean, 1873.</i> |
| Myatt's ash-leaved kidney. | <i>Id.</i> |
| Royal ash top | <i>Id.</i> |
| Early Bird | <i>J. Wrench and Sons, 1881.</i> |
| British ash leaf. | <i>R. Dean, 1881.</i> |
| Ash leaf Lady Gordon | <i>Th. Gibbs, 1882.</i> |
| Early Monarch | <i>Id.</i> |
| Lady Paget | <i>Id.</i> |
| Rixton's kidney | <i>Id.</i> |
| Veitch's ash leaf | <i>Id.</i> |
| Russe | <i>E. Hamel, 1883.</i> |
| Early Hammersmith | <i>J. Rigault, 1885.</i> |
| Essex Challenge | <i>Id.</i> |
| Prince of Wales | <i>W. Gloede, 1873.</i> |
| Joseph Rigault. | <i>J. Rigault, 1883.</i> |
| Albion ash-leaved | <i>W. Porter, 1879.</i> |
| Cromwell | <i>R. Dean, 1883.</i> |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| The Shiner | <i>Soc. d'hort. de Londres, 1877.</i> |
| Six semaines, n° 1 | <i>M. de Jonghe, 1849.</i> |
| Alice Fenn | <i>Soc. d'hort. de Londres, 1877.</i> |
| Pygmée de Ross | <i>P. Lawson and Son, 1834.</i> |
| Cosmopolitan | <i>R. Dean, 1882.</i> |
| Lily white. | <i>R. Dean, 1883.</i> |
| Busch's Edelweiss | <i>A. Busch, 1885.</i> |
| Early white kidney. | <i>R. Dean, 1875.</i> |
| Oxfordshire kidney. | <i>Soc. d'hort. de Londres, 1877.</i> |
| Edgcote seedling. | <i>R. Dean, 1881.</i> |
| Sainte-Hélène | <i>L. Paillet, 1872.</i> |
| { Belle Augustine | <i>M. Hézard, 1853.</i> |
| { L'Augustine d'Étampes | <i>A. Bonnemain, 1853.</i> |
| { Saucisse de Villaine | <i>Villaine, 1869.</i> |
| { La Boulangère | <i>J. Mayeux, 1882.</i> |
| Belle de Fontenay | <i>J. Rigault, 1885.</i> |
| Cattell's Eclips kidney | <i>Hurst and Son, 1875.</i> |
| Cattell's Reliance kidney. | <i>Hurst and Son, 1875.</i> |
| { KING OF FLUKES | <i>Cooper and Bolton, 1864.</i> |
| { King of the potatoes. | <i>Sutton and Sons, 1873.</i> |
| { King | <i>W. Gloede, 1873.</i> |
| Meldrum Conqueror. | <i>W. Porter, 1879.</i> |
| Early King. | <i>Th. Gibbs, 1882.</i> |
| Advance | <i>R. Dean, 1881.</i> |
| { Woodstock kidney | <i>R. Dean, 1881.</i> |
| { Belle de Vincennes. | <i>E. Forgeot, 1883.</i> |
| Chancellor. | <i>R. Dean, 1883.</i> |
| Queen of the South. | <i>Kerr and Fotheringham, 1884.</i> |
| { Confédérée | <i>G. Mulligan, 1864.</i> |
| { Marceau. | <i>G. Bataille, 1873.</i> |
| { Islandaise | <i>A. Gontier, 1876.</i> |
| { Weisse späte Rosen. | <i>A. Busch, 1877.</i> |
| { Genest | <i>Genest et Féraud, 1879.</i> |
| Souvenir du Concours. | <i>M. Chipier, 1885.</i> |

SECTION 14

Tubercules en rognon ou en amande, jaunes panachés de violet.

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Bonaparte | <i>A. Lémon, 1858.</i> |
| { Achille Lémon | <i>A. Lémon, 1858.</i> |
| { Corne | <i>Souilliard et Brunelet, 1872.</i> |
| { Charpentier | <i>M. Charpentier, 1880.</i> |
| { Jaune longue à œil violet | <i>Richard Gilbert, 1882.</i> |
| La Vierge. | <i>J. Rigault, 1885.</i> |
| Cattell's Advancer kidney. | <i>Hurst and Son, 1875.</i> |
| Midsummer kidney. | <i>R. Dean, 1883.</i> |
| { Violette de Carignan | <i>M. Baudelot, 1874.</i> |
| { Rémy. | <i>Loise-Chauvière, 1874.</i> |
| Acmé. | <i>Fr. von Gröling, 1875.</i> |
| Weather Bell | <i>Th. Gibbs, 1882.</i> |
| Francisca nigra | <i>J. Rigault, 1885.</i> |

SECTION 15

Tubercules lisses, aplatis, oblongs, rarement en rognon, jaunes panachés de rouge.

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Quarantaine à tête rose | <i>Souilliard et Brunelet, 1872.</i> |
| Barron's Perfection | <i>Rev. W. F. Radclyffe, 1870.</i> |
| Empress Eugenie. | <i>W. Gloede, 1872.</i> |
| Princess of Wales. | <i>R. Dean, 1879.</i> |
| { CALICO (RUBANNÉE). | <i>Thorburn and Co, 1870.</i> |
| { Gleason's late | <i>R. Dean, 1873.</i> |
| { Ruban rouge | <i>M. Vavin, 1873.</i> |
| { New Hundredfold fluke. | <i>Sutton and Sons, 1873.</i> |
| Carpenter. | <i>W. Porter, 1879.</i> |
| Early Oneida | <i>J. Wrench and Sons, 1875.</i> |
| New red fluke | <i>W. Porter, 1879.</i> |
| SAUCISSE BLANCHE | <i>M. Perdrigeon, 1879.</i> |

IV. — ROSÉES, RONDES ET OBRONDES

SECTION 16

Tubercules rose pâle, entaillés, arrondis ou légèrement allongés.

Germes roses.

Fleurs abondantes, blanches, roses ou lilas.

| | |
|---|------------------------------------|
| { Patraque blanche. | <i>Halle de Paris</i> , 1815. |
| { Benefits. | <i>M. Mugendie</i> , 1845. |
| { Rouge pâle soixante pour un | <i>Collection suédoise</i> , 1867. |
| { Blanche de Savoie | <i>St-Pierre d'Albigny</i> , 1883. |
| { Topinambour. | <i>M. Théveny</i> , 1874. |
| { Dauphinoise | <i>M. Théveny</i> , 1875. |
| { Américaine. | <i>Senlis</i> , 1852. |
| { Lesèble | <i>Courtois-Gérard</i> , 1874. |
| { Moussot | <i>Bretagne</i> , 1874. |
| { Connaught Cup | <i>P. Lawson and Son</i> , 1834. |
| { Rohan | <i>Prince de Rohan</i> , 1838. |
| { D'Islande. | <i>A. Robert</i> , 1849. |
| Lippische Rose. | <i>F. Heine</i> , 1884. |
| Rosalie (<i>Paulsen</i>) | <i>L.-J. Gathoye</i> , 1884. |
| Aurora | <i>W. Paulsen</i> , 1882. |
| Aurélie (<i>Paulsen</i>). | <i>L.-J. Gathoye</i> , 1884. |

V. — ROUGES RONDES

SECTION 17

Tubercules gris rosé ou rouges, ronds.

Germes roses.

Fleurs ordinairement nulles.

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| { La Virolle. | <i>Départ. des Ardennes</i> , 1815. |
| { Rouge d'Espagne. | <i>M. Picard</i> , 1820. |
| Griesenhager | <i>Fr. von Gröling</i> , 1877. |

- { Ognon rose demi-hâtive. *Collection suédoise*, 1867.
 { SächsischeZwiebelkartoffelweissfleischige *A. Busch*, 1877.
 { Rouge de Bohême *P^{ce} de Schwartzemberg*, 1877.
 { SächsischeZwiebelkartoffelgelbfleischige. *A. Busch*, 1877.
 { Aradaras *Potager de Versailles*, 1874.
 { Papas de Santiago du Chili *Société d'acclimatation*, 1860.
 { Redder *Docteur Cénas*, 1876.
-

SECTION 18

Tubercules rouges, ronds.

Germes rouges.

Fleurs blanches.

- { TRUFFE D'AOUT. *Halle de Paris*, 1815.
 { Hâtive de Pontarlier *M. Piéry*, 1837.
 { White pink *M. Magendie*, 1845.
 { Rouge de Bavière *M. Rabœuf*, 1867.
 { Printanière *M. Verlot*, 1874.
 Grise printanière *M. Petitmange*, 1885.
 Rouge ronde de Virey *M. Théveny*, 1874.
 { Saint-Louis, tardive *M. Goldenberg*, 1848.
 { Rosine *M. Posth*, 1856.
 Noirmoutiers *M. Théveny*, 1875.
 Rouge de Paterson *Collection suédoise*, 1867.
 Clairebonne *Départ. des Ardennes*, 1815.
 Nouvelle des Vosges. *M. Parisot*, 1837.
 Rouge pâle hâtive *P. Lawson and Son*, 1834.
 Rouge de La Mure *M. Prudhomme*, 1866.
 Roville. *M. Théveny*, 1875.
 De Guernesey. *M. Théveny*, 1875.
 Rouge de Bretagne *M. Rieffel*, 1881.
 Barochates. *M. Petitmange*, 1885.
 { Gris Flamand *M. Ackermann*, 1841.
 { Printanière de Sarreguemines *M. Royer*, 1844.

| | |
|---|---------------------------------------|
| { La Bertin | <i>M. Bertin</i> , 1839. |
| { Bertin rouge à fleur blanche. | <i>Société de Saint-Omer</i> , 1856. |
| Toute bonne | <i>M. Verlot</i> , 1874. |
| Descroizille | <i>M. Sageret</i> , 1815. |
| Quarantaine. | <i>Halle de Paris</i> , 1815. |
| V ^e Anty | <i>M. Caron</i> , 1876. |
| { De Zélande | <i>M. Gielen</i> , 1867. |
| { Rouge de Californie | <i>Collection suédoise</i> , 1867. |
| { De Hollande | <i>M^{lles} Robin</i> , 1869. |
| { Tricolore | <i>F. Van Celst</i> , 1873. |
| { Red Regent's. | <i>W. Porter</i> , 1879. |
| Gosforth seedling | <i>W. Porter</i> , 1879. |
| Bedfont rose | <i>R. Dean</i> , 1885. |
| Reading Russet. | <i>R. Dean</i> , 1883. |

SECTION 19

Tubercules rouges, ronds.
 Germes rouges.
 Fleurs violettes ou rougeâtres.

| | |
|-------------------------------------|--|
| { Early Emperor Napoleon. | <i>Rev. W. F. Radclyffe</i> , 1870. |
| { Early red Emperor. | <i>R. Dean</i> , 1873. |
| { De Montreuil | <i>Courtois-Gérard</i> , 1874. |
| Grampian | <i>Nutting and Sons</i> , 1878. |
| Hâtive de Meudon | <i>Environs de Paris</i> , 1817. |
| Bertin rouge à fleur rouge. | <i>Société de Saint-Omer</i> , 1856. |
| { Rouge de Strasbourg. | <i>M. Dinner-Royer</i> , 1846. |
| { Wery. | <i>M. Simonis père</i> , 1847. |
| D'Osterode | <i>M. Duvalliers</i> , 1840. |
| Rio Frio | <i>Schubart und Hesse</i> , 1853. |
| De Suisse dure farineuse | <i>Collection suédoise</i> , 1867. |
| Rouge de Bretagne. | <i>M. Poulain</i> , 1882. |
| Bonne jusqu'en mars | <i>Collection suédoise</i> , 1867. |
| Renommée | <i>Institut agr. de Beauvais</i> , 1877. |

| | |
|--|--|
| { La Bernarde | <i>M. Thomas</i> , 1817. |
| { Hosen Muller | <i>M. Boussingault</i> , 1848. |
| { Dabersche | <i>Fr. von Gröling</i> , 1873. |
| { Frühe rothe märkische | <i>Id.</i> |
| { De Poméranie | <i>M. Verlot</i> , 1874. |
| { Haute rouge | <i>M. Petitmange</i> , 1885. |
| Tardive d'Aschersleben | <i>Collection suédoise</i> , 1867. |
| Tardive de Pesca | <i>Collection suédoise</i> , 1867. |
| { De Vevey | <i>Ch. Payot</i> , 1869. |
| { Grise de Chablais | <i>M. Théveny</i> , 1875. |
| Fürstenwalder | <i>M. Boursier</i> , 1885. |
| De Naples | <i>M. Théveny</i> , 1875. |
| De Zélande à fleur violette | <i>M. Théveny</i> , 1875. |
| { Sutton's red skinned Flour ball (FARINEUSE | |
| ROUGE) | <i>Sutton and Sons</i> , 1872. |
| { Washington | <i>M. Rabanf</i> , 1869. |
| { De l'Amérique | <i>M. Hautois</i> , 1874. |
| { Boule de farine | <i>M. Hautin</i> , 1875. |
| { Garnet Chili | <i>Fr. von Gröling</i> , 1875. |
| { Brinckworth Challenger | <i>Godefroy Lebeuf</i> , 1879. |
| Adirondack | <i>Hooper and Co</i> , 1882. |
| Centennial | <i>W. Porter</i> , 1879. |
| { MERVEILLE D'AMÉRIQUE | <i>A. Gontier</i> , 1874. |
| { Rouge d'Amérique | <i>M. Tripier-Durieu</i> , 1879. |
| { Américaine | <i>Exp. de Clermont-Ferrand</i> , 1880 |
| Wood's scarlet prolific | <i>Sutton and Sons</i> , 1872. |
| Triomphe de Lyon | <i>C. de Loisy</i> , 1883. |
| Triumph | <i>R. Dean</i> , 1881. |
| Granat | <i>F. Heine</i> , 1883. |



VI. — ROUGES LONGUES LISSES

SECTION 20

Tubercules rouges, lisses, allongés, en forme de rognon.

Germes très rouges. — Fleurs blanches.

| | |
|--|--------------------------------------|
| { ROUGE DE HOLLANDE | <i>Halle de Paris</i> , 1815. |
| { La Schulammel | <i>Départ. de la Sarre</i> , 1815. |
| { Kidney géante de Robertson | <i>P. Lawson and Son</i> , 1834. |
| { Cornichon rouge | <i>Société de Saint-Omer</i> , 1856. |
| { Cornette rose | <i>Cherbourg</i> , 1871. |
| { Cornette rouge | <i>Adrien Lebas</i> , 1881. |
| { Wonderful red kidney (KIDNEY ROUGE HAT.) | <i>R. Dean</i> , 1873. |
| { Red ash leaf. | <i>R. Dean</i> , 1875. |
| Bountiful. | <i>R. Dean</i> , 1874. |
| Garibaldi. | <i>R. Dean</i> , 1877. |
| A frire | <i>M. Théveny</i> , 1874. |
| Cardinal | <i>R. Dean</i> , 1883. |
| Wiltshire Giant. | <i>R. Dean</i> , 1883. |

SECTION 21

Tubercules roses, allongés, en forme de rognon ou droits et légèrement entaillés.

Germes roses. — Fleurs blanches.

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| { Knight | <i>M. Rameau</i> , 1832. |
| { Hardy | <i>H. Caron</i> , 1876. |
| { ROGNON ROSE (Jaune longue). | <i>M. Goldenberg</i> , 1848. |
| { Lord Airve | <i>Collection suédoise</i> , 1867. |
| { Rose de Jersey. | <i>W. Gloede</i> , 1873. |
| { Cornichon de la Moselle. | <i>Id.</i> |
| { Belgian kidney. | <i>R. Dean</i> , 1873. |
| { Rose allongée | <i>M. Théveny</i> , 1874. |
| { De Vigny | <i>Courtois-Gérard</i> , 1874. |
| { Wolff | <i>M. Théveny</i> , 1875. |
| { Bec de cane | <i>Id.</i> |
| { Salmon kidney. | <i>Th. Gibbs</i> , 1882. |
| { Comice de Cambrai. | <i>J. Dessort</i> , 1884. |
| Napoléon. | <i>W. Porter</i> , 1879. |
| Briffaut | <i>M. Verlot</i> , 1874. |
| Progress | <i>R. Dean</i> , 1883. |
| Prizetaker. | <i>R. Dean</i> , 1883. |

| | |
|---|--------------------------------------|
| { Xavier | <i>M. Sommelier</i> , 1849. |
| { Patte blanche | <i>M. Magnery</i> , 1848. |
| { Longue rosée | <i>M. Bazin</i> , 1852. |
| { Rosace de Villiers-le-Bel, Rosée de Conflans. | <i>Halle de Paris</i> , 1847. |
| { Cucilleuse. | <i>M. Bazin</i> , 1850. |
| { De Hollande (Lotin) | <i>Potager de Versailles</i> , 1874. |
| { Corne de béliér | <i>M. Théveny</i> , 1875. |
| { Saucisse blonde | <i>Id.</i> |
| { Madame. | <i>Id.</i> |
| Fin bec. | <i>M. Chenest</i> , 1873. |
| { Saint-André de Suède <i>ou</i> Pousse-debout. | <i>Thierry-Tollard</i> , 1847. |
| { Rognon de coq Lejeay | <i>A. Blay</i> , 1882. |
| Vitelotte lisse de la Halle | <i>M. Fournier</i> , 1870. |
| Arlequin (feuillage panaché) | <i>Haage et Schmidt</i> , 1884. |

VII. — ROUGES APLATIES

SECTION 22

Tubercules roses, aplatis, oblongs.

Germes roses. — Fleurs blanches.

| | |
|-------------------------------------|---|
| { EARLY ROSE (ROSE HATIVE). | <i>Thorburn and C^o</i> , 1870. |
| { Américaine | <i>M. Baudelot</i> , 1874. |
| { Américaine | <i>M. Pierrat</i> , 1878. |
| { La généreuse | <i>Loise-Chauvière</i> , 1876. |
| Extra early Vermont | <i>Bliss and Sons</i> , 1874. |
| Late rose. | <i>R. Dean</i> , 1876. |
| Early Gem | <i>R. Dean</i> , 1876. |
| Early Ohio. | <i>Bliss and Sons</i> , 1881. |
| Rose ronde. | <i>M. Chipier</i> , 1885. |
| Rosette | <i>Semis</i> , 1864. |
| Mr Bresee. | <i>R. Dean</i> , 1881. |
| Beauty of Hebron. | <i>Thorburn and C^o</i> , 1880. |
| Trophy | <i>Th. Gibbs</i> , 1882. |
| Matchless | <i>R. Dean</i> , 1882. |
| King of the early | <i>Thorburn and C^o</i> , 1872. |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Early Dexter. | <i>Bliss and Sons</i> , 1874. |
| White blossomed. | <i>M. Caron</i> , 1876. |
| * Red Roach | <i>R. Dean</i> , 1883. |
| * Vineuse | <i>M. Chipier</i> , 1885. |
| * Rosebud | <i>R. Dean</i> , 1885. |
| * Rufus | <i>R. Dean</i> , 1885. |

* La floraison de ces quatre dernières variétés n'ayant pu être observée jusqu'ici, leur classement, fait seulement d'après les caractères des tubercules et des germes, ne saurait être regardé comme définitif.

SECTION 23

Tubercules rouges, aplatis.

Germes roses ou rouges.

Fleurs rouges ou violettes.

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Saucisse ou Généreuse | <i>Halle de Paris</i> , 1867. |
| Rouge tardive | <i>M. Gombaut-Villette</i> , 1863. |
| Cottager's red | <i>R. Dean</i> , 1873. |
| Du Bienfaiteur. | <i>M. Belin</i> , 1873. |
| Vitelotte belge. | <i>Valognes</i> , 1876. |
| Savonnette | <i>Id.</i> |
| De Blidah | <i>Exposition de Bourg</i> , 1883. |
| De table. | <i>Jules Pobé</i> , 1884. |
| Plate rouge | <i>Le Carré et Kervello</i> , 1884. |
| Kidney rose. | <i>M. Verlot</i> , 1874. |
| Irish Cup. | <i>Th. Gibbs</i> , 1882. |
| Hollandaise rose ancienne | <i>Docteur Cénas</i> , 1876. |
| Gayet | <i>M. Théveny</i> , 1874. |
| Queen of the Valley | <i>R. Dean</i> , 1882. |
| Brownell's ou Vermont Beauty. | <i>Bliss and Sons</i> , 1874. |
| Keystone | <i>W. Porter</i> , 1879. |
| Devonshire | <i>Th. Gibbs</i> , 1882. |
| Perra. | <i>M. Chipier</i> , 1885. |
| Brownell's Superior | <i>R. Dean</i> , 1877. |
| Ruby. | <i>A. Busch</i> , 1877. |
| Prima Dona. | <i>W. Paulsen</i> , 1882. |

VIII. — ROUGES LONGUES ENTAILLÉES

SECTION 24

Tubercules longs, entaillés, rouges ou panachés jaune et rouge.
Germes roses ou rouges.

| | |
|--|--|
| { VITELOTTE à chair blanche | <i>Halle de Paris, 1815.</i> |
| { Corne de chèvre | <i>Départ. des Ardennes, 1815.</i> |
| { de St-Jacques (Jacob's grundbirn). | <i>Départ. de la Frise, 1815.</i> |
| { La taupe | <i>Départ. des Forêts, 1815.</i> |
| { La souris tardive | <i>Id.</i> |
| { Rouge longue nouée | <i>Société de Saint-Omer, 1856.</i> |
| { Rouge longue | <i>A. Blay, 1882.</i> |
| Rouge longue d'Aix-la-Chapelle. | <i>Collection suédoise, 1867.</i> |
| Vitелotte d'Albany. | <i>H. Rigault, 1878.</i> |
| Red Fir apple. | <i>Sutton and Sons, 1885.</i> |
| { Rouge incomparable | <i>Fr. von Gröling, 1877.</i> |
| { Bleue de Paterson | <i>Collection suédoise, 1867.</i> |
| { Pink-eyed Dairy maid | <i>P. Lawson and Son, 1846.</i> |
| { Barré. | <i>M. Landresse, 1856.</i> |
| { Schultenmann | <i>Société d'agriculture, 1854.</i> |
| Valognaise. | <i>Valognes, 1876.</i> |
| Crapaudine | <i>M. Caron, 1876.</i> |
| { Mangel Wurzel | <i>P. Lawson and Son, 1841.</i> |
| { Catawhisa | <i>Ferme-école de Lavallade, 1866.</i> |
| { Busch potato. | <i>A. Busch, 1877.</i> |
| Bovina | <i>Vietor Kersanté, 1874.</i> |
| Rouge des Hes Marmont | <i>Potager de Versailles, 1874.</i> |
| Tuttle's Excelsior | <i>J. Wrench and Sons, 1875.</i> |
| Riesen Sand Kartoffel | <i>A. Busch, 1877.</i> |
| { Panachée de printemps | <i>Collection suédoise, 1867.</i> |
| { Vanélie | <i>W. Gloede, 1873.</i> |
| { Salmon kidney | <i>Id.</i> |
| { Yam ou Igname | <i>P. Lawson and Son, 1834.</i> |
| { Durham. | <i>M. Jullien, 1844.</i> |



IX. — PANACHÉES ROUGES

SECTION 25

Tubercules ronds, jaunes panachés de rouge.

Germes roses ou rouges.

Fleurs blanches.

| | |
|----------------------------|--|
| { Comice d'Amiens. | <i>M. Pingré de Guimicourt</i> , 1851. |
| { De Zélande | <i>M. Meissonnier</i> , 1848. |
| { Sand ardappel | <i>MM. Boss frères</i> , 1842. |
| Howora. | <i>F. Heine</i> , 1883. |
| Farmer's blush. | <i>J. Wrench and Sons</i> , 1875. |
| { Willard. | <i>Thorburn and Co</i> , 1872. |
| { Red fluke | <i>R. Dean</i> , 1875. |

SECTION 26

Tubercules ronds, légèrement aplatis, jaunes panachés de rouges.

Germes roses ou rouges.

Fleurs rouges ou violettes.

| | |
|---------------------------------|--|
| { Reine Blanche | <i>M. Converset</i> , 1869. |
| { Red Peach blow | <i>Bliss and Sons</i> , 1874. |
| { Yeux rouges. | <i>M. Sermage</i> , 1875. |
| Lye's Favourite | <i>Daniels Brothers</i> , 1877. |
| Peach blow | <i>Bliss and Sons</i> , 1874. |
| Extra early Peach blow. | <i>Bliss and Sons</i> , 1880. |
| White Peach blow | <i>Bliss and Sons</i> , 1874. |
| Bole Zægling | <i>Jules Moré</i> , 1863. |
| Rouge de Flandre | <i>M. Moll</i> , 1844. |
| Wellington | <i>Angleterre</i> , 1868. |
| Ledoux. | <i>Exposition de La Villette</i> , 1869. |
| Chamonix. | <i>Courtois-Gérard</i> , 1874. |
| Jeanneton | <i>M. Théveny</i> , 1876. |
| Red Breadfruit. | <i>R. Dean</i> , 1879. |
| Golden Eagle | <i>W. Porter</i> , 1879. |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Lady Webster | W. Porter, 1879. |
| Andrew Lammie | Sutton and Sons, 1885. |
| Pink eyes | W. Porter, 1879. |
| Rouge de Mulhouse | Collection suédoise, 1867. |
| La Rognon | M. Rameau, 1832. |
| { Divergente ou Brugcoise | Départ. de l'Escaut, 1815. |
| { Le Bienfaiteur | M. de Jonghe, 1849. |
| { Du Mexique | M. Kleinholt, 1856. |
| { Somneltière | M. Théveny, 1875. |
| Radstock Beauty | W. Porter, 1879. |
| Mexicaine | M. Berne, 1875. |
| OEil rouge | M. Théveny, 1875. |
| Sutton's early Regent potato | Sutton and Sons, 1885. |
| Irish pink-eyed | P. Lawson and Son, 1846. |
| Forster's early Peach blow | J. Wrench and Son, 1875. |
| { De Bogota | M. Is. Geoffroy St-Hilaire, 1858. |
| { De Sainte-Marthe | Société d'acclimatation, 1859. |
| { De la Nouvelle-Grenade | Comte de Fontenay, 1867. |
| Beauty of Kent | Sutton and Sons, 1885. |

X. — PANACHÉES VIOLETTES

SECTION 27

Tubercules ronds, violets ou plus ou moins panachés [de] violet, principalement autour des yeux.

Germes violets.

Fleurs lilas avortant fréquemment.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Grisette | M. Gontier, 1846. |
| { Violette | M ^{me} Vilmorin, 1862. |
| { Rosny | M. Charpentier-Trianon, 1862. |
| { Biscuit bleu marbré | Collection suédoise, 1867. |
| Breadfruit red | Collection suédoise, 1867. |
| Blue plate hâtive | W. Gloede, 1873. |
| De Champagne rouge | M. Théveny, 1874. |

- Manhattan. *R. Dean*, 1881.
- Hobokiers. *Van Geert*, 1852.
- Dalhousie. *J. Rigault*, 1885.
- { Droppers *M. Magendie*, 1845.
- { Jaspée *Ferme-école de Lavallade*, 1866.
- Violette marbrée de Caracas *Collection suédoise*, 1867.
- Rose du Chail *M. Boncenne fils*, 1884.
- { BLANCHARD *M. de Vuitry*, 1859.
- { Peake's first early *Soc. d'hort. de Londres*, 1877.
- { Farineuse jaune de Lassay *H. Martin*, 1883.
- { Hâtive de Bourbon-Lancy *M. Quiclet*, 1838.
- { Bleue hâtive. *M. Boussingault*, 1848.
- { Bourbon-Lancy *M. de Liron*, 1853.
- { Grosse violette hâtive. *M. Godat*, 1868.
- { Rigoberte. *M. Théveny*, 1876.
- Hermaphrodite rouge. *Collection suédoise*, 1867.
- Tiftie's Annie *Th. Gibbs*, 1882.
- The Favourite. *R. Dean*, 1875.
- D'Australie *Société d'acclimatation*, 1864.
- { De Californie *Docteur Cénas*, 1876.
- { De San-Francisco. *Id.*
- { Early Don *Angleterre*, 1868.
- { Rintoul's early Don. *Th. Gibbs*, 1882.
- Bonne ronde hâtive de Belgique. *Collection suédoise*, 1867.
- Bleue jaune *Adrien Lebas*, 1881.
- Oeil violet. 1855.
- Beauty of the West. *R. Dean*, 1884.
- Boule panachée. *M. Chipier*, 1885.
- Des Elies *M. Verlot*, 1874.
- Albert. *W. Porter*, 1879.
- Frühe blaue runde *Fr. von Gröling*, 1873.
- Frühe blaue *F. Heine*, 1883.
- Neshannock *M. Leclerc*, 1867.



XI. — VIOLETTES RONDES

SECTION 28

Tubercules violets, ronds, quelquefois un peu aplatis.

Germes violets, exceptionnellement rougeâtres.

Fleurs violettes ou lilas.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Blanc des Forêts | <i>Départ. des Forêts, 1815.</i> |
| Violette de Lanilis | <i>M. Guesnet, 1836.</i> |
| Calebasse | <i>Ferme-école de Lavallade, 1866.</i> |
| Porto-Allegro | <i>Collection suédoise, 1867.</i> |
| Tardive du Chili | <i>Id.</i> |
| Péruvienne | <i>Id.</i> |
| Tardive de Bretagne | <i>Courtois-Gérard, 1874.</i> |
| Violette de Champagnole | <i>M. Chauvin, 1874.</i> |
| Vendécenne violette | <i>M. Théveny, 1875.</i> |
| Lorraine | <i>J. Rigault, 1885.</i> |
| Scotch blue | <i>R. Dean, 1877.</i> |
| { La Jersey | <i>M. Morel de Vindé, 1819.</i> |
| { Terre | <i>Ferme-école de Lavallade, 1866.</i> |
| { Purple Regent | <i>R. Dean, 1873.</i> |
| Champignon | <i>Collection suédoise, 1867.</i> |
| Vosgienne | <i>M. Lecomte, 1875.</i> |
| The Dean | <i>R. Dean, 1883.</i> |
| Violette Rampal | <i>Docteur Cénas, 1876.</i> |
| De Suède | <i>M. Derbecq, 1869.</i> |
| Auvergnate | <i>Souesmes, 1877.</i> |
| Violette de Grandchamp | <i>M. Chipier, 1885.</i> |
| { VIOLETTE | <i>Halle de Paris, 1815.</i> |
| { Ruziana | <i>Société d'acclimatation, 1864.</i> |
| { Hundredfold | <i>Potager de Versailles, 1874.</i> |
| Maréchal Vaillant | <i>W. Gloede, 1873.</i> |
| Joséphine | <i>J. Rigault, 1885.</i> |
| Vellez | <i>Société d'acclimatation, 1869.</i> |
| Onion potato | <i>P. Lawson and Son, 1840.</i> |
| Violette (<i>Strub</i>) | <i>M. Strub, 1872.</i> |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| La Vierge. | <i>M. Sommelier</i> , 1840. |
| { La Bleue | <i>M. Martin de Giberques</i> , 1875. |
| { Brune de Vichy | <i>M. Broquette</i> , 1872. |
| Blue fluke. | <i>Th. Gibbs</i> , 1832. |
| Du Cacique | <i>M. Barbier</i> , 1878. |

SECTION 29

Tubercules violets, généralement oblongs, plus ou moins aplatis, parfois entaillés.

Germes violets.

Fleurs blanches.

| | |
|---|---|
| Compton's Surprise. | <i>Bliss and Sons</i> , 1874. |
| Violette d'Islande. | <i>M. Beurnonville</i> , 1874. |
| Birmingham blue. | <i>R. Dean</i> , 1875. |
| Defiance | <i>R. Dean</i> , 1882. |
| Blauschalige Hummelshainer | <i>A. Busch</i> , 1877. |
| Vicar of Laleham. | <i>R. Dean</i> , 1879. |
| Purple King. | <i>R. Dean</i> , 1883. |
| Blaue späte Rosen | <i>A. Busch</i> , 1877. |
| { Lankmann ou Chandernagor. | <i>Comte de Bussy</i> , 1821. |
| { Noire des Indes | <i>M. Théveny</i> , 1875. |
| Noire des montagnes de Suisse | <i>M. Gauffre</i> , 1836. |
| A cœur noir | <i>Ferme-école de Lavallade</i> , 1866. |
| Noire tardive de Sago | <i>Collection suédoise</i> , 1867. |
| Vendécenne noire | <i>M. Théveny</i> , 1875. |
| Négresse | <i>M. Jacqueau</i> , 1884. |

XII. — VIOLETTES LONGUES

SECTION 30

Tubercules violets, allongés, en forme de rognon ou d'amande.
Germes violets.

- | | |
|--|--|
| { Purple ash-leaved kidney | <i>R. Dean</i> , 1873. |
| { Jersey purple | <i>M. Verlot</i> , 1874. |
| { Black kidney | <i>Id.</i> |
| { Black Prince. | <i>Nutting and Sons</i> , 1878. |
| { Select blue ash leaf. | <i>W. Porter</i> , 1879. |
| { Paterson's long blue | <i>Angleterre</i> , 1879. |
| Crimson walnut leaf. | <i>R. Dean</i> , 1877. |
| { Early ash-leaved kidney | <i>Angleterre</i> , 1857. |
| { Late London dwarf kidney | <i>Comte de Gourcy</i> , 1852. |
| Early purple | <i>R. Dean</i> , 1881. |
| American purple | <i>R. Dean</i> , 1881. |
| La Cuisinière. | <i>M. Chipier</i> , 1885. |
| { ROGNON VIOLET (QUARANTAINE VIOLETTE. | |
| <i>Halle de Paris</i>). | <i>Collection suédoise</i> , 1867. |
| { Violette longue | <i>Halle de Paris</i> , 1874. |
| Van Acker | <i>Torcy-Vannier</i> , 1882. |
| Giant blue. | <i>W. Porter</i> , 1879. |
| Blue Perfection. | <i>Th. Gibbs</i> , 1882. |
| Edgcote purple. | <i>R. Dean</i> , 1883. |
| { Santa-Helena | <i>Société d'acclimatation</i> , 1864. |
| { Smith's seedling | <i>M. Verlot</i> , 1874. |
| Précieuse de Châtillon | <i>A. Blay</i> , 1882. |



LISTE ALPHABÉTIQUE

(Les noms des variétés considérées comme distinctes sont imprimés en caractères ordinaires et ceux des synonymes en *italiques*.)

| | Pages |
|---|-------|
| Achille Lémon, S. 14. | 16 |
| Achilles, S. 6 | 7 |
| Acmé, S. 14. | 16 |
| A cœur noir, S. 29 | 29 |
| Adirondack, S. 19. | 20 |
| Advance, S. 13 | 15 |
| <i>A feuille de noyer</i> , S. 10 | 11 |
| A feuille d'ortie, S. 10 | 12 |
| A frire, S. 20. | 21 |
| Albert, S. 27 | 27 |
| Albion ash-leaved, S. 13. | 14 |
| Alderman, S. 5 | 6 |
| Alice Fenn, S. 13 | 15 |
| Alkohol, S. 5 | 7 |
| <i>des Allinges</i> , S. 6 | 7 |
| Alpha, S. 7. | 10 |
| Amarante, S. 6 | 7 |
| <i>Américaine</i> (Collection suédoise, 1867), S. 6. | 7 |
| <i>Américaine</i> (Senlis, 1852), S. 16. | 17 |
| <i>Américaine</i> (Exp. de Clermont-Ferrand, 1880), S. 19 | 20 |
| <i>Américaine</i> (M. Baudelot, 1874), S. 22 | 22 |
| <i>Américaine</i> (M. Pierrat, 1878), S. 22 | 22 |
| <i>Américaine blanche</i> , S. 6 | 8 |
| <i>Américaine hâtive élevée</i> , S. 1 | 2 |
| American Magnum bonum, S. 7. | 10 |
| American purple, S. 30. | 30 |
| <i>d'Amérique</i> , S. 2. | 4 |
| <i>de l'Amérique</i> , S. 19 | 20 |
| Ananas, S. 9 | 11 |
| Ananas longue, S. 9 | 11 |
| Anderssen, S. 5. | 6 |
| Andrew Lammie, S. 26 | 26 |
| <i>Anglaise</i> , S. 12 | 13 |
| <i>Anglaise à forcer</i> , S. 1. | 2 |
| <i>Anglaise Erin's Queen</i> , S. 2. | 3 |

| | Pages |
|--|-------|
| <i>d'Août</i> , S. 2. | 3 |
| Aradaras, S. 17 | 18 |
| des Ardennes, S. 6. | 7 |
| <i>d'Argentan</i> , S. 6. | 8 |
| Arlequin (feuillage panaché), S. 21. | 22 |
| <i>Arrondie de Beaune</i> , S. 2 | 4 |
| <i>Ash leaf Lady Gordon</i> , S. 13 | 14 |
| <i>Ash top fluke</i> , S. 12 | 13 |
| Asperge, S. 9. | 11 |
| Aspersie, S. 9. | 11 |
| <i>l'Augustine d'Étampes</i> , S. 13 | 15 |
| Aurélie, S. 16. | 17 |
| Aurora, S. 16. | 17 |
| d'Australie, S. 27 | 27 |
| Auvergnate, S. 28. | 28 |
| Avalanche, S. 12 | 13 |
| | |
| Barochates, S. 18 | 18 |
| <i>Barré</i> , S. 24 | 24 |
| Barron's Perfection, S. 15 | 16 |
| Beauty of Hebron, S. 22 | 22 |
| Beauty of Kent, S. 26 | 26 |
| Beauty of the West, S. 27 | 27 |
| <i>Bec de cane</i> , S. 21. | 21 |
| Bedfont prolific, S. 6. | 8 |
| Bedfont rose, S. 18. | 19 |
| <i>Belgian kidney</i> , S. 21 | 21 |
| Belle Augustine, S. 13. | 15 |
| Belle de Fontenay, S. 13 | 15 |
| <i>Belle de Vincennes</i> (M. Payot, 1874), S. 11 | 12 |
| <i>Belle de Vincennes</i> (E. Forgeot, 1883), S. 13. | 15 |
| <i>Belle Marianne</i> , S. 4. | 5 |
| <i>Benefits</i> , S. 16. | 17 |
| la Bernarde, S. 19. | 20 |
| la Bertin, S. 18 | 19 |
| <i>Bertin rouge à fleur blanche</i> , S. 18. | 19 |
| Bertin rouge à fleur rouge, S. 19 | 19 |
| <i>du Bienfaiteur</i> (M. Belin, 1873), S. 23. | 23 |
| <i>le Bienfaiteur</i> (M. de Jonghe, 1849), S. 26. | 26 |
| Birmingham blue, S. 29 | 29 |
| Biscuit blanc, S. 5. | 6 |
| <i>Biscuit bleu marbré</i> , S. 27 | 26 |
| <i>Bisquit</i> , S. 5 | 6 |
| <i>Black kidney</i> , S. 30 | 30 |

| | Pages |
|---|-------|
| <i>Black Prince</i> , S. 30 | 30 |
| Blanc de lait, S. 41 | 12 |
| Blanchard, S. 27 | 27 |
| <i>Blanche à fleur blanche</i> , S. 6 | 7 |
| <i>Blanche Belmenane</i> , S. 6 | 7 |
| <i>Blanche de Savoie</i> , S. 16 | 17 |
| <i>Blanche longue</i> , S. 8 | 10 |
| Blanchette, S. 5 | 7 |
| Blaue späte Rosen, S. 29 | 29 |
| Blauschalige Hummelshainer, S. 29 | 29 |
| la Bleue, S. 28 | 29 |
| <i>Bleue de Paterson</i> , S. 24 | 24 |
| Bleue des Forêts, S. 28 | 28 |
| <i>Bleue hâtive</i> , S. 27 | 27 |
| Bleue jaune, S. 27 | 27 |
| Bleue plate hâtive, S. 27 | 26 |
| <i>de Blidah</i> , S. 23 | 23 |
| Blue fluke, S. 28 | 29 |
| Blue Perfection, S. 30 | 30 |
| de Bogota, S. 26 | 26 |
| Bole Zægling, S. 26 | 25 |
| Bonaparte, S. 14 | 16 |
| Bonne blanche, S. 12 | 13 |
| Bonne jusqu'en mars, S. 19 | 19 |
| Bonne ronde hâtive de Belgique, S. 27 | 27 |
| Bonne Wilhelmine, S. 1 | 1 |
| Bonnemain, S. 11 | 12 |
| <i>la Boulangère</i> , S. 13 | 15 |
| <i>Boulangère d'Irlande</i> , S. 12 | 13 |
| <i>Boule de farine</i> , S. 19 | 20 |
| Boule panachée, S. 27 | 27 |
| Bountiful, S. 20 | 21 |
| <i>Bourbon-Lancy</i> , S. 27 | 27 |
| <i>Bourguignonne hâtive</i> , S. 2 | 3 |
| Bovina, S. 24 | 24 |
| Breadfruit. Voy. Fruit à pain, S. 1 | 2 |
| Breadfruit red, S. 27 | 26 |
| Bresee's Peerless, S. 7 | 9 |
| Bresee's prolific, S. 7 | 9 |
| Briffaut, S. 21 | 21 |
| <i>Brinckworth Challenger</i> , S. 19 | 20 |
| <i>Brise-motte</i> , S. 6 | 7 |
| <i>de Bristol</i> , S. 9 | 11 |
| <i>British ash leaf</i> , S. 13 | 14 |

| | Pages |
|---|-------|
| <i>British Queen</i> , S. 2. | 4 |
| Brownell's <i>ou</i> Vermont Beauty, S. 23. | 23 |
| Brownell's Best, S. 8. | 10 |
| Brownell's Multiplier, S. 7 | 9 |
| Brownell's Success, S. 7 | 10 |
| Brownell's Superior, S. 23 | 23 |
| Brugeoise. <i>Voy.</i> Divergeante, S. 26 | 26 |
| <i>Brune de Vichy</i> , S. 28 | 29 |
| <i>Bryanstone kidney early</i> , S. 12 | 14 |
| Burbank's seedling, S. 7 | 9 |
| Busch's Edelweiss, S. 13 | 15 |
| <i>Busch potato</i> , S. 2½ | 24 |
| du Cacique, S. 28. | 29 |
| Caillaud, S. 5 | 6 |
| <i>Calebasse</i> , S. 28 | 28 |
| Calico (Rubannée), S. 15 | 16 |
| de Californie, S. 27 | 27 |
| Canada, S. 5 | 7 |
| Canadienne, S. 6 | 8 |
| <i>Cantaloup pintans</i> , S. 9 | 11 |
| Cardinal, S. 20 | 21 |
| Carpenter, S. 15. | 16 |
| <i>Carter's early Race horse</i> , S. 13 | 14 |
| <i>Catachisa</i> , S. 24. | 24 |
| Cattell's Advancer kidney, S. 14. | 16 |
| Cattell's Eclips kidney, S. 13 | 15 |
| Cattell's Reliance kidney, S. 13 | 15 |
| Centennial, S. 19 | 20 |
| Cerdagne jaune, S. 6. | 8 |
| <i>Cerdagne ronde</i> , S. 2. | 3 |
| <i>Chagford kidney</i> , S. 12. | 14 |
| Chairman, S. 1 | 1 |
| Chamois, S. 6. | 8 |
| Chamonix, S. 26 | 25 |
| <i>de Champagne jaune</i> , S. 1. | 2 |
| <i>de Champagne rouge</i> , S. 27. | 26 |
| Champignon, S. 28. | 28 |
| Champion, S. 3 | 5 |
| <i>Champion kidney</i> , S. 12 | 14 |
| Chancellor, S. 13 | 15 |
| Chandernagor. <i>Voy.</i> Lankmann, S. 29. | 29 |
| <i>Chanoy</i> , S. 2 | 3 |
| Chardon (de Saxe; graine de Saxe), S. 6 | 8 |

| | Pages |
|--|-------|
| Chardon améliorée, S. 5 | 7 |
| Chardonne, S. 6. | 8 |
| Charpentier, S. 14. | 16 |
| du Château de Yermoloff, S. 7 | 9 |
| Châtillonnaise, S. 2. | 3 |
| Châtillonnaise améliorée, S. 5 | 6 |
| Chave. Voy. Shaw, S. 2 | 3 |
| Chipier, S. 7 | 10 |
| Circassienne, S. 2 | 3 |
| Citronnelle, S. 9. | 11 |
| Clairebonne, S. 18. | 18 |
| Clairieu, S. 6. | 7 |
| Cobbler's Lapstone true, S. 12. | 13 |
| Cockney, S. 2. | 4 |
| de Combes, S. 10 | 11 |
| de Comice, S. 6 | 8 |
| Comice d'Amiens, S. 25. | 25 |
| Comice de Cambrai, S. 21. | 21 |
| Compton's Surprise, S. 29 | 29 |
| Confédérée, S. 13 | 15 |
| Connaught Cup, S. 16 | 17 |
| des Cordillières, S. 3. | 4 |
| Corne, S. 14. | 16 |
| Corne de bélier, S. 21. | 22 |
| Corne de chèvre, S. 24 | 24 |
| Cornette rose, S. 20 | 21 |
| Cornette rouge, S. 20. | 21 |
| Cornichon de la Moselle, S. 21 | 21 |
| Cornichon Langrois, S. 11 | 12 |
| Cornichon rouge, S. 20. | 21 |
| Cornichon tardif, S. 11. | 12 |
| Cosmopolitan, S. 13 | 15 |
| Cottager's red, S. 23 | 23 |
| Covent Garden Perfection, S. 7 | 10 |
| Crapaudine, S. 24 | 24 |
| Crimson walnut leaf, S. 30 | 30 |
| Cromwell, S. 13. | 14 |
| Cueilleuse, S. 21. | 22 |
| la Cuisinière, S. 30 | 30 |
| Cyane, S. 4. | 5 |
| Dabersche, S. 19 | 20 |
| Dalhousie, S. 27 | 27 |
| Dalmahoy (Ireland and Thomson, 1878), S. 1 | 1 |

| | Pages |
|--|-------|
| <i>Dalmahoy</i> (R. Dean, 1874), S. 2. | 3 |
| <i>Daubenton</i> , S. 5. | 6 |
| <i>Dauphinoise</i> , S. 16. | 17 |
| Dawes Matchless, S. 12. | 14 |
| the Dean, S. 28. | 28 |
| Defiance, S. 29. | 29 |
| Descroizille, S. 18. | 19 |
| <i>Deux fois l'an</i> , S. 10. | 11 |
| Devonshire, S. 23. | 23 |
| <i>Dévorante</i> , S. 3. | 4 |
| Diäta, S. 4. | 5 |
| Divergeante ou Brugeoise, S. 26. | 26 |
| <i>Docteur Bretonneau</i> , S. 2. | 3 |
| the Doctor, S. 6. | 8 |
| Don of the day, S. 1. | 2 |
| Douce blanche, S. 4. | 5 |
| de Dracy-le-Fort, S. 5. | 6 |
| Droppers, S. 27. | 27 |
| <i>Druid</i> , S. 3. | 5 |
| Duke of Albany, S. 5. | 6 |
| Dunbar Regent, S. 2. | 4 |
| <i>Durham</i> , S. 24. | 24 |
| | |
| <i>Early Alma kidney</i> , S. 13. | 14 |
| Early ash-leaved kidney, S. 30. | 30 |
| <i>Early Bedford kidney</i> , S. 10. | 12 |
| <i>Early Bird</i> , S. 13. | 14 |
| Early Border, S. 8. | 10 |
| Early Climax, S. 8. | 10 |
| Early Cluster, S. 5. | 6 |
| Early Cottage, S. 1. | 2 |
| Early Dexter, S. 22. | 23 |
| Early Dimmisk, S. 4. | 5 |
| Early Don, S. 27. | 27 |
| Early Emperor Napoleon, S. 19. | 19 |
| Early Gem, S. 22. | 22 |
| Early giant King, S. 3. | 5 |
| Early Gooderich, S. 7. | 10 |
| <i>Early Hammersmith</i> , S. 13. | 14 |
| Early King, S. 13. | 15 |
| Early Mayflower, S. 7. | 9 |
| <i>Early Monarch</i> , S. 13. | 14 |
| Early Ohio, S. 22. | 22 |
| Early Oneida, S. 15. | 16 |

| | Pages |
|--|-------|
| Early Perfection, S. 1 | 2 |
| Early purple, S. 30 | 30 |
| <i>Early red Emperor</i> , S. 49. | 19 |
| <i>Early Reliance</i> , S. 13. | 14 |
| Early rose (Rose hâtive), S. 22 | 22 |
| <i>Early Sovereign</i> , S. 1 | 2 |
| <i>Early walnut-leaved kidney</i> , S. 10 | 11 |
| Early white kidney, S. 43 | 15 |
| Edgcote purple, S. 30 | 30 |
| Edgcote seedling, S. 43 | 15 |
| des Elies, S. 27 | 27 |
| Empress Eugenie, S. 45 | 16 |
| <i>England's Fair beauty</i> , S. 42 | 14 |
| England's Pride, S. 7 | 9 |
| <i>Epinard</i> , S. 6. | 8 |
| Erste von Nassengrund, S. 6 | 7 |
| <i>Essex Challenge</i> , S. 43 | 14 |
| Euphylls, S. 5 | 7 |
| Eureka, S. 7 | 9 |
| Excellente naine, S. 11. | 12 |
| <i>Excelsior kidney</i> , S. 12. | 14 |
| Extra early Peach blow, S. 26 | 25 |
| Extra early Vermont, S. 22. | 22 |
| <i>Farineuse de Chartres</i> , S. 2. | 4 |
| <i>Farineuse jaune de Lassay</i> , S. 27 | 27 |
| Farineuse rouge. <i>Voy.</i> Sutton red skinned Flour ball, S. 49. | 20 |
| <i>Farinosa</i> , S. 6. | 7 |
| Farmer's blush, S. 25 | 25 |
| the Favourite, S. 27 | 27 |
| Feinste kleine weisse Mandel, S. 12 | 13 |
| Feltham white, S. 4 | 2 |
| Fenn's early market, S. 5. | 6 |
| Fenn's Onward, S. 4. | 2 |
| <i>Fermière picarde</i> , S. 2 | 4 |
| Fillbasket, S. 5 | 6 |
| Fin bec, S. 24. | 22 |
| Fine hâtive, S. 1 | 2 |
| Fine peau, S. 1 | 2 |
| Flocon de neige (Snowflake), S. 7 | 9 |
| <i>Flour ball</i> , S. 4. | 1 |
| Flukes, S. 12. | 13 |
| Forster's early Peach blow, S. 26 | 26 |
| <i>Fosseuse</i> , S. 6. | 8 |

| | Pages |
|---|-------|
| <i>Fouilleuse</i> , S. 40. | 12 |
| <i>Francisca nigra</i> , S. 44. | 16 |
| <i>Freebearer</i> , S. 2. | 4 |
| <i>Frémont</i> , S. 5. | 7 |
| <i>Frühe blaue</i> , S. 27. | 27 |
| <i>Frühe blaue runde</i> , S. 27. | 27 |
| <i>Frühe Nassengrunder</i> , S. 5. | 6 |
| <i>Frühe rothe märkische</i> , S. 19. | 20 |
| <i>Frühe Zucker</i> , S. 5. | 6 |
| <i>Fruit à pain</i> (Breadfruit), S. 1. | 2 |
| <i>Fürst Bismarck</i> , S. 5. | 7 |
| <i>Fürstenwalder</i> , S. 19. | 20 |
| <i>Gaillefontaine</i> , S. 2. | 3 |
| <i>Garibaldi</i> , S. 20. | 21 |
| <i>Garnet Chili</i> , S. 19. | 20 |
| <i>Gayet</i> , S. 23. | 23 |
| <i>Gelbe rose</i> , S. 6. | 8 |
| <i>la Génèreuse</i> (<i>M. Dumont-Carment</i> , 1858), S. 2. | 3 |
| <i>la Génèreuse</i> (<i>A. Morlot</i> , 1876), S. 10. | 12 |
| <i>la Génèreuse</i> (<i>Loise-Chauvière</i> , 1876), S. 22. | 22 |
| <i>Génèreuse. Voy. Saucisse</i> , S. 23. | 23 |
| <i>Genest</i> , S. 13. | 15 |
| <i>Giant blue</i> , S. 30. | 30 |
| <i>Gleason's late</i> , S. 15. | 16 |
| <i>Glenbervie</i> , S. 1. | 2 |
| <i>Gloire de Baltimore</i> , S. 5. | 6 |
| <i>Goldelse</i> , S. 1. | 2 |
| <i>Golden Eagle</i> , S. 26. | 25 |
| <i>Gosforth seedling</i> , S. 18. | 19 |
| <i>Grampian</i> , S. 19. | 19 |
| <i>Granat</i> , S. 19. | 20 |
| <i>Grande précoce de Montevideo</i> , S. 5. | 6 |
| <i>Grange Bruyère</i> , S. 7. | 9 |
| <i>Griesenhager</i> , S. 17. | 17 |
| <i>Gris flamand</i> , S. 18. | 18 |
| <i>Grise arrondie</i> , S. 1. | 2 |
| <i>Grise de Chablais</i> , S. 19. | 20 |
| <i>Grise printanière</i> , S. 18. | 18 |
| <i>Grisette</i> , S. 27. | 26 |
| <i>Grosse d'Amérique</i> , S. 6. | 7 |
| <i>Grosse de Voiron</i> , S. 2. | 4 |
| <i>Grosse farineuse</i> , S. 4. | 5 |
| <i>Grosse jaune deuxième hâtive</i> , S. 2. | 3 |

LISTE ALPHABÉTIQUE.

39

Pages

| | |
|--|----|
| <i>Grosse violette hâtive</i> , S. 27 | 27 |
| Gryffe castle seedling, S. 2 | 4 |
| de Guernesey, S. 18 | 18 |
| <i>Guyrandienne</i> , S. 2 | 3 |
| <i>Handworth's prolific</i> , S. 1 | 2 |
| <i>Hardy</i> , S. 21 | 21 |
| Harrison's n° II, S. 6 | 8 |
| <i>Harry kidney</i> , S. 13 | 14 |
| Harvester, S. 5 | 6 |
| Hâtive de Bourbon-Lancy, S. 27 | 27 |
| <i>Hâtive de Langres</i> , S. 2 | 3 |
| Hâtive de Meudon, S. 19 | 19 |
| <i>Hâtive de Pontarlier</i> , S. 18 | 18 |
| <i>Hâtive des environs de Bruxelles</i> , S. 5 | 6 |
| <i>Haute rouge</i> , S. 19 | 20 |
| Henderson's prolific, S. 6 | 8 |
| Hermann, S. 6 | 7 |
| Hermaphrodite rouge, S. 27 | 27 |
| Hertha, S. 6 | 8 |
| Hétéroclite ronde, S. 1 | 1 |
| Hobokiers, S. 27 | 27 |
| Hogg's Coldstream, S. 3 | 4 |
| <i>Hollandaise hâtive à œil bleu</i> , S. 12 | 13 |
| <i>Hollandaise, Quarantaine de Perthuis</i> , S. 11 | 12 |
| Hollandaise rose ancienne, S. 23 | 23 |
| <i>de Hollande</i> (M ^{lles} Robin, 1869), S. 18 | 19 |
| <i>de Hollande</i> (Lotin) (<i>Potager de Versailles</i> , 1874), S. 21 | 22 |
| Holländische Zucker, S. 5 | 6 |
| <i>Hongroise</i> , S. 2 | 3 |
| <i>Hooper's round white</i> , S. 6 | 8 |
| Hornycroft's seedling var. fol., S. 12 | 14 |
| Hortensie, S. 6 | 8 |
| <i>Hosen Muller</i> , S. 19 | 20 |
| Howora, S. 25 | 25 |
| <i>de Howorst</i> , S. 1 | 1 |
| <i>Hundredfold</i> , S. 28 | 28 |
| Ice cream, S. 7 | 9 |
| Idaho, S. 7 | 10 |
| Igname. <i>Voy. Yam</i> , S. 24 | 24 |
| Imbriquée, S. 9 | 11 |
| <i>Improved ash top fluke</i> , S. 12 | 13 |
| <i>Improved Victoria</i> , S. 3 | 5 |

| | Pages |
|---|-------|
| <i>Infernale</i> , S. 6. | 8 |
| Intermedio, S. 5. | 6 |
| International kidney, S. 12. | 13 |
| <i>Irish Apple</i> , S. 1. | 1 |
| Irish Cup, S. 23. | 23 |
| Irish pink-eyed, S. 26. | 26 |
| <i>Islandaise</i> , S. 13. | 15 |
| <i>d'Islande</i> , S. 16. | 17 |
| <i>Jackson Urbith</i> , S. 7. | 9 |
| Jackson's white, S. 5. | 7 |
| <i>Jacob's grundbirn</i> . Voy. de St Jacques, S. 24. | 24 |
| <i>Jaspée</i> , S. 27. | 27 |
| Jaune d'août, S. 5. | 6 |
| <i>Jaune de Chauvigny</i> , S. 2. | 3 |
| Jaune longue. Voy. Rognon rose, S. 21. | 21 |
| <i>Jaune longue à œil violet</i> , S. 14. | 16 |
| <i>Jaune longue d'Auvergne</i> , S. 11. | 12 |
| <i>Jaune longue de Brie</i> , S. 11. | 12 |
| Jaune longue de Hollande. Voy. Parmentière, S. 11. | 12 |
| <i>Jaune longue plate</i> (A. Blay, 1882), S. 7. | 9 |
| <i>Jaune longue plate</i> (Morlaix, 1882), S. 12. | 13 |
| <i>Jaune ronde</i> (M. Roussel, 1864), S. 2. | 4 |
| Jaune ronde (<i>École Mathieu de Dombasle</i>), S. 6. | 8 |
| <i>Jaune ronde demi-hâtive</i> , S. 2. | 3 |
| Jaune ronde hâtive, S. 2. | 3 |
| <i>Jaune ronde pour primeur</i> , S. 1. | 1 |
| Jaune ronde très hâtive, S. 2. | 4 |
| Jeancé (Jeuxy; Juxière; Vosgienne), S. 6. | 7 |
| Jeanneton, S. 26. | 25 |
| la Jersey, S. 28. | 28 |
| <i>Jersey purple</i> , S. 30. | 30 |
| Jeuxy. Voy. Jeancé, S. 6. | 7 |
| Joseph Rigault, S. 13. | 14 |
| Joséphine, S. 28. | 28 |
| Juxière. Voy. Jeancé, S. 6. | 7 |
| <i>Juxière améliorée</i> , S. 6. | 7 |
| Kaiser-Kartoffel, S. 7. | 9 |
| Kaiser Wilhelm, S. 7. | 9 |
| Keystone, S. 23. | 23 |
| Kidney ou Marjolin, S. 10. | 11 |
| <i>Kidney géante de Robertson</i> , S. 20. | 21 |
| Kidney rose, S. 23. | 23 |

| | Pages |
|---|--------|
| Kidney rouge hâtive. <i>Voy.</i> Wonderful red kidney, S. 20 | 21 |
| <i>King</i> , S. 13 | 15 |
| King Noble, S. 6. | 8 |
| King of Flukes, S. 13. | 15 |
| King of the early, S. 22. | 22 |
| <i>King of the potatoes</i> , S. 13. | 15 |
| King of the West, S. 8. | 10 |
| Knight, S. 21 | 21 |
| Kopsel's frühe weisse Rosen-Kartoffel, S. 7 | 9 |
| Kusko, S. 6. | 8 |
| <i>Lady Paget</i> , S. 13. | 14 |
| Lady Webster, S. 26. | 26 |
| Lankmann ou Chandernagor, S. 29 | 29 |
| Lapstone, S. 12 | 13 |
| <i>Late London dwarf kidney</i> , S. 30 | 30 |
| Late rose, S. 22 | 22 |
| Lawson's Conqueror, S. 5. | 6 |
| <i>Ledoux</i> (<i>Ledoux-Bonvat</i> , 1869), S. 4 | 5 |
| <i>Ledoux</i> (<i>Exposition de la Villette</i> , 1869), S. 26 | 25 |
| Lerchen-Kartoffel, S. 4. | 5 |
| Lerchen-Rose, S. 3. | 5 |
| <i>Lesèble</i> , S. 16 | 17 |
| de Lesquin, S. 3. | 4 |
| Lily white, S. 13. | 15 |
| <i>Limal. Voy.</i> Philadelphie, S. 4 | 2 |
| Lippische Rose, S. 16. | 17 |
| London Hero, S. 1. | 2 |
| <i>Longue rosée</i> , S. 21. | 22 |
| <i>Lord Airve</i> , S. 21 | 21 |
| <i>Lord Mayor</i> , S. 4 | 5 |
| <i>la Lorraine</i> , S. 6 | 7 |
| <i>Lorraine</i> , S. 28 | 28 |
| <i>Lothe</i> , S. 5 | 6 |
| <i>Louis d'or</i> , S. 1 | 1 |
| <i>Lubbenauer</i> , S. 1. | 2 |
| <i>Luxembourgeoise</i> , S. 9 | 11 |
| Lye's Favourite, S. 26 | 25 |
| <i>Maconnaise</i> , S. 6. | 8 |
| <i>Madame</i> , S. 21. | 22 |
| <i>Madame Périer</i> , S. 1 | 2 |
| <i>Magnet</i> , S. 12. | 13 |
| <i>Mairtens' early</i> , S. 1. | 2 |

| | Pages |
|---|-------|
| <i>de Malesherbes</i> , S. 6 | 8 |
| <i>de Malte</i> , S. 6 | 7 |
| <i>Mammoth Pearl</i> , S. 7 | 9 |
| <i>Mangel Wurzel</i> , S. 24 | 24 |
| <i>Manhattan</i> , S. 27 | 27 |
| <i>Manning's kidney</i> , S. 12 | 14 |
| <i>Marceau</i> , S. 13 | 15 |
| <i>Maréchal Vaillant</i> , S. 28 | 28 |
| <i>Marjolin. Voy. Kidney</i> , S. 10 | 11 |
| <i>Marjolin Burgeon</i> , S. 12 | 13 |
| <i>Marjolin Faure</i> , S. 12 | 13 |
| <i>Marjolin tardive</i> , S. 11 | 12 |
| <i>Marjolin Têtard</i> , S. 10 | 12 |
| <i>Marksman</i> , S. 7 | 9 |
| <i>Matador</i> , S. 6 | 7 |
| <i>Matchless</i> , S. 22 | 22 |
| <i>Meldrum Conqueror</i> , S. 13 | 15 |
| <i>Mercerès d'Amérique</i> , S. 3 | 5 |
| <i>Merveille d'Amérique</i> , S. 19 | 20 |
| <i>Mexicaine</i> , S. 26 | 26 |
| <i>du Mexique</i> , S. 26 | 26 |
| <i>Midsummer kidney</i> , S. 14 | 16 |
| <i>Milky white</i> , S. 7 | 10 |
| <i>Model</i> , S. 1 | 2 |
| <i>Mona's Pride</i> , S. 10 | 11 |
| <i>Montagnarde</i> , S. 2 | 3 |
| <i>Montenaille tardivissime</i> , S. 6 | 8 |
| <i>de Montreuil</i> , S. 19 | 19 |
| <i>Morville</i> , S. 2 | 4 |
| <i>Mousson blanche</i> , S. 2 | 4 |
| <i>Moussot</i> , S. 16 | 17 |
| <i>Mr Bresee</i> , S. 22 | 22 |
| <i>Myatt's ash-leaved kidney</i> , S. 13 | 14 |
| <i>Myatt's Coquette</i> , S. 7 | 9 |
| <i>Naine hâtive</i> , S. 1 | 1 |
| <i>de Naples</i> , S. 19 | 20 |
| <i>Napoléon</i> , S. 21 | 21 |
| <i>Napoléone</i> , S. 11 | 12 |
| <i>Négresse</i> , S. 29 | 29 |
| <i>Neshannock</i> , S. 27 | 27 |
| <i>de Neuf semaines (M. Pariselle, 1879)</i> , S. 1 | 1 |
| <i>de Neuf semaines (M. Posth, 1856)</i> , S. 2 | 3 |
| <i>de Neuf semaines (M. Jullien, 1841)</i> , S. 5 | 6 |

| | Pages |
|---|-------|
| New Cambridge kidney, S. 12. | 13 |
| <i>New Hundredfold fluke</i> , S. 15 | 16 |
| New red fluke, S. 15. | 16 |
| <i>Noire des Indes</i> , S. 29. | 29 |
| Noire des montagnes de Suisse, S. 29 | 29 |
| Noire tardive de Sago, S. 29. | 29 |
| Noirmoutiers, S. 18 | 18 |
| Noisette Sainville, S. 12 | 13 |
| Non such, S. 8 | 10 |
| de Norwège, S. 5 | 6 |
| Nouvelle des Vosges, S. 18 | 18 |
| <i>de la Nouvelle-Grenade</i> , S. 26 | 26 |
| Oblongue de Malabry, S. 7 | 9 |
| Odin, S. 6 | 8 |
| OEil rouge, S. 26 | 26 |
| OEil violet, S. 27 | 27 |
| Ognon rose demi-hâtive, S. 17 | 18 |
| Onion potato, S. 28. | 28 |
| d'Osterode, S. 19 | 19 |
| <i>Oxford</i> , S. 1. | 2 |
| Oxfordshire kidney, S. 13 | 15 |
| Panachée de printemps, S. 24. | 24 |
| <i>Papas de Santiago du Chili</i> , S. 17 | 18 |
| Parisienne, S. 7. | 9 |
| Parmentière ou Jaune longue de Hollande, S. 11. | 12 |
| Paterson's Albert, S. 1. | 1 |
| <i>Paterson's long blue</i> , S. 30 | 30 |
| Paterson's Victoria, S. 3 | 5 |
| <i>Patraque blanche</i> (<i>M. Théveny</i> , 1875), S. 2. | 3 |
| <i>Patraque blanche</i> (<i>Halle de Paris</i> , 1815), S. 16. | 17 |
| <i>Patraque jaune</i> , S. 2. | 3 |
| <i>Patte blanche</i> , S. 21 | 22 |
| Peach blow, S. 26 | 25 |
| <i>Peake's first early</i> , S. 27 | 27 |
| <i>Pebble white</i> , S. 12. | 13 |
| Peeters, S. 7. | 9 |
| <i>Perfection kidney</i> , S. 12. | 13 |
| Perra, S. 23. | 23 |
| <i>Peruvian</i> , S. 1 | 2 |
| <i>Péruvienne</i> , S. 28 | 28 |
| <i>Pfluckmans</i> , S. 10 | 11 |
| <i>Philadelphie ou Limal</i> , S. 1. | 2 |

| | Pages |
|--|-------|
| Pink-eyed Dairy maid, S. 24 | 24 |
| Pink eyes, S. 26. | 26 |
| Pioneer, S. 44. | 42 |
| <i>Plate</i> , S. 12. | 43 |
| <i>Plate blanche</i> , S. 12 | 43 |
| <i>Plate d'Amérique</i> , S. 12 | 43 |
| <i>Plate de Bretagne</i> , S. 12 | 43 |
| <i>Plate de Saout</i> , S. 12. | 43 |
| <i>Plate rouge</i> , S. 23 | 23 |
| Plentiful, S. 5. | 7 |
| <i>de Poméranie</i> , S. 19 | 20 |
| Porter's Excelsior, S. 5. | 6 |
| <i>Porto-Allegro</i> , S. 28 | 28 |
| Pousse-debout. <i>Voy.</i> Saint-André de Suède, S. 21 | 22 |
| Précieuse de Châtillon, S. 30. | 30 |
| Précieuse de Fitz-James, S. 44 | 42 |
| Precious seedling, S. 7. | 40 |
| Précoce de Harvey, S. 4 | 2 |
| Premier. S. 8. | 40 |
| Président (<i>R. Dean</i> , 1873), S. 7 | 40 |
| Président II (<i>R. Dean</i> , 1885), S. 6. | 8 |
| Pride of America, S. 7 | 9 |
| Pride of Ontario, S. 7 | 9 |
| Pride of the market, S. 3. | 5 |
| Prima Dona, S. 23. | 23 |
| Prime Minister, S. 3. | 5 |
| <i>Prince de Galles</i> , S. 4. | 2 |
| Prince of Wales, S. 43. | 44 |
| Princess of Wales, S. 43 | 46 |
| Princesse, S. 44 | 42 |
| Pringle, S. 7 | 40 |
| <i>Printanière</i> (<i>Antibes</i> , 1881), S. 2. | 3 |
| <i>Printanière</i> (<i>M. Verlot</i> , 1874), S. 48 | 48 |
| <i>Printanière de Beaune</i> , S. 2. | 3 |
| <i>Printanière de Sarreguemines</i> , S. 48 | 48 |
| Prizetaker, S. 24. | 21 |
| Progress, S. 21 | 21 |
| Prolifique hâtive, S. 4. | 2 |
| Purlie, S. 4. | 5 |
| Purple ash-leaved kidney, S. 30. | 30 |
| Purple King, S. 29. | 29 |
| <i>Purple Regent</i> , S. 28. | 28 |
| Pygmée de Ross, S. 43. | 45 |

| | Pages |
|--|-------|
| des Pyrénées (<i>Dr Cénas</i> , 1876), S. 2 | 4 |
| <i>des Pyrénées</i> (germes roses) (<i>Dr Cénas</i> , 1876), S. 6 | 8 |
| <i>Quarantaine</i> (<i>Halle de Paris</i> , 1875), S. 10 | 11 |
| <i>Quarantaine</i> (<i>Halle de Paris</i> , 1815), S. 18 | 19 |
| <i>Quarantaine à tête rose</i> , S. 15 | 16 |
| <i>Quarantaine de Montreuil</i> , S. 11 | 12 |
| <i>Quarantaine de Noisy</i> , S. 11 | 12 |
| <i>Quarantaine de Perthuis. Voy. Hollandaise</i> , S. 11 | 12 |
| <i>Quarantaine violette. Voy. Rognon violet</i> , S. 30 | 30 |
| Quebec's Profit, S. 1 | 2 |
| Queen of the South, S. 13 | 15 |
| Queen of the Valley, S. 23 | 23 |
| <i>the Queen potato</i> , S. 2 | 4 |
| Radstock Beauty, S. 26 | 26 |
| Reading Hero, S. 3 | 5 |
| Reading Russet, S. 18 | 19 |
| Recorder, S. 12 | 14 |
| Rector of Woodstock, S. 1 | 2 |
| <i>Red ash leaf</i> , S. 20 | 21 |
| Red Breadfruit, S. 26 | 25 |
| Red Fir apple, S. 24 | 24 |
| <i>Red fluke</i> , S. 25 | 25 |
| <i>Red Peach blow</i> , S. 26 | 25 |
| <i>Red Regent's</i> , S. 18 | 19 |
| Red Roach, S. 22 | 23 |
| <i>Redder</i> , S. 17 | 18 |
| Regent, S. 2 | 4 |
| Reine Blanche, S. 26 | 25 |
| Reine de mai, S. 10 | 12 |
| <i>Rémy</i> , S. 14 | 16 |
| <i>Renneville</i> , S. 7 | 9 |
| Renommée, S. 19 | 19 |
| <i>Richard</i> , S. 2 | 4 |
| <i>Richesse</i> , S. 11 | 12 |
| Richter's Edelstein, S. 7 | 9 |
| Richter's Imperator, S. 3 | 5 |
| Richter's lange weisse, S. 8 | 10 |
| Richter's Schneerose, S. 8 | 10 |
| Rickmaker, S. 6 | 8 |
| <i>Riesen Marmont</i> , S. 6 | 8 |
| Riesen Sand Kartoffel, S. 24 | 24 |

| | Pages |
|--|-------|
| <i>Rigoberte</i> , S. 27 | 27 |
| <i>Rintoul's early Don</i> , S. 27. | 27 |
| Rio Frio, S. 49 | 49 |
| <i>Rivers' Royal ash-leaved kidney</i> , S. 43 | 44 |
| <i>Rixton's kidney</i> , S. 43 | 44 |
| <i>Rixton's Pippin</i> , S. 12 | 43 |
| Riz de M. Colas, S. 2. | 3 |
| la Rognon, S. 26. | 26 |
| <i>Rognon de coq Lejeay</i> , S. 21. | 22 |
| <i>Rognon naine à forcer</i> , S. 12 | 43 |
| Rognon rose (Jaune longue), S. 21. | 21 |
| Rognon violet (Quarantaine violette, <i>Halle de Paris</i>), S. 30. | 30 |
| <i>Rohan</i> , S. 16 | 17 |
| <i>Ronde d'Alger</i> , S. 1 | 1 |
| <i>Ronde de Caracas</i> , S. 1. | 1 |
| <i>Ronde de trois mois</i> , S. 2 | 3 |
| <i>Ronde lûtive</i> , S. 2 | 3 |
| Rosace de Villiers-le-Bel, S. 21 | 22 |
| Rosalie, S. 16. | 17 |
| <i>Rose allongée</i> , S. 21 | 21 |
| <i>Rose de Jersey</i> , S. 21. | 21 |
| Rose du Chail, S. 27 | 27 |
| Rose hâtive. <i>Voy.</i> Early rose, S. 22 | 22 |
| Rose ronde, S. 22 | 22 |
| Rosebud, S. 22 | 23 |
| Rosée de Conflans. <i>Voy.</i> Rosace de Villiers-le-Bel, S. 21 | 22 |
| Rosette, S. 22. | 22 |
| <i>Rosine</i> , S. 18 | 18 |
| <i>Rosny</i> , S. 27 | 26 |
| <i>Ross's early</i> , S. 1 | 2 |
| <i>Rouge d'Amérique</i> , S. 49 | 20 |
| <i>Rouge de Bavière</i> , S. 18. | 18 |
| Rouge de Bohême, S. 17 | 18 |
| Rouge de Bretagne (<i>M. Rieffel</i> , 1881), S. 18. | 18 |
| Rouge de Bretagne (<i>M. Poulain</i> , 1882), S. 19 | 19 |
| <i>Rouge de Californie</i> , S. 18. | 19 |
| <i>Rouge d'Espagne</i> , S. 17 | 17 |
| Rouge de Flandre, S. 26 | 25 |
| Rouge de Hollande, S. 20. | 21 |
| Rouge de La Mure, S. 18. | 18 |
| Rouge de Mulhouse, S. 26. | 26 |
| Rouge de Paterson, S. 18 | 18 |
| Rouge de Strasbourg, S. 19. | 19 |
| Rouge des Iles Marmont, S. 24 | 24 |

| | Pages |
|---|-------|
| Rouge incomparable, S. 24. | 24 |
| <i>Rouge longue</i> , S. 24. | 24 |
| Rouge longue d'Aix-la-Chapelle, S. 24. | 24 |
| <i>Rouge longue nouée</i> , S. 24. | 24 |
| Rouge pâle hâtive, S. 18. | 18 |
| <i>Rouge pâle soixante pour un</i> , S. 16. | 17 |
| Rouge ronde de Virey, S. 18. | 18 |
| <i>Rouge tardive</i> , S. 23. | 23 |
| <i>Round ash leaf</i> , S. 1. | 1 |
| Roville, S. 18. | 18 |
| Royal ash-leaved kidney, S. 13. | 14 |
| <i>Royal ash top</i> , S. 13. | 14 |
| <i>Royal George</i> , S. 2. | 3 |
| <i>Ruban rouge</i> , S. 15. | 16 |
| Rubannée. <i>Voy. Calico</i> , S. 15. | 16 |
| Ruby, S. 23. | 23 |
| Rufus, S. 22. | 23 |
| <i>Rufziana</i> , S. 28. | 28 |
| <i>Russe</i> , S. 13. | 14 |
| Rustycot pink-eyed, S. 5. | 7 |
| <i>Sächsische Zwiebelkartoffel gelbfleischige</i> , S. 17. | 18 |
| <i>Sächsische Zwiebelkartoffel weissfleischige</i> , S. 17. | 18 |
| Saint-André de Suède ou Pousse-debout, S. 21. | 22 |
| Sainte-Hélène, S. 13. | 15 |
| <i>Sainte-Hélène tardive</i> , S. 3. | 4 |
| <i>de Saint-Jacques</i> (Jacob's grundbirn), S. 24. | 24 |
| Saint-Jean, S. 2. | 4 |
| Saint-Louis tardive, S. 18. | 18 |
| <i>de Sainte-Marthe</i> , S. 26. | 26 |
| Saint-Patrick, S. 7. | 9 |
| <i>Salmon kidney</i> (Th. Gibbs, 1882), S. 21. | 21 |
| <i>Salmon kidney</i> (W. Gloede, 1873), S. 24. | 24 |
| <i>de San-Francisco</i> , S. 27. | 27 |
| <i>Sancerre</i> (Société d'agriculture, 1850), S. 2. | 3 |
| <i>Sancerre</i> (H. Caron, 1876), S. 5. | 6 |
| <i>Sand ardappel</i> , S. 25. | 25 |
| <i>Sandringham early kidney</i> , S. 10. | 11 |
| <i>Sandy's seedling</i> , S. 12. | 13 |
| Santa-Helena, S. 30. | 30 |
| Saucisse ou Généreuse, S. 23. | 23 |
| <i>Saucisse blanche</i> (Baron d'Arène, 1875), S. 7. | 9 |
| <i>Saucisse blanche</i> (M. Perdrigeon, 1879), S. 15. | 16 |
| <i>Saucisse blonde</i> , S. 21. | 22 |

| | Pages |
|--|-------|
| <i>Sauvresse de Villaine</i> , S. 13. | 15 |
| <i>Savonnette</i> , S. 23 | 23 |
| de Saxe. <i>Voy.</i> Chardon, S. 6 | 8 |
| Schoolmaster, S. 5. | 6 |
| <i>la Schulammel</i> , S. 20. | 21 |
| <i>Schultenmann</i> , S. 2 $\frac{1}{2}$ | 24 |
| Scotch blue, S. 28 | 28 |
| <i>Scotch Champion</i> . <i>Voy.</i> Champion, S. 3. | 5 |
| Scottish Queen, S. 3 | 5 |
| <i>Sechswochen Kartoffel</i> , S. 10. | 11 |
| Seed, S. 5 | 6 |
| Segonzac, S. 2. | 4 |
| <i>Seguin</i> , S. 3. | 4 |
| <i>Select blue ash leaf</i> , S. 30. | 30 |
| <i>Semis des Cordillières</i> , S. 3 | 4 |
| Shaw (Chave), S. 2. | 3 |
| <i>the Shiner</i> (R. Dean, 1878), S. 10. | 11 |
| <i>the Shiner</i> (R. Dean, 1874), S. 12 | 14 |
| <i>the Shiner</i> (<i>Société d'horticulture de Londres</i> , 1877), S. 13. | 15 |
| Silverskin, S. 6. | 8 |
| Six semaines, n° 1, S. 13. | 15 |
| Smith's curly, S. 1 | 2 |
| <i>Smith's seedling</i> , S. 30 | 30 |
| Snowball, S. 7. | 9 |
| Snowdrop, S. 10. | 12 |
| Snowflake. <i>Voy.</i> Flocon de neige, S. 7 | 9 |
| <i>Sommeltière</i> , S. 26. | 26 |
| <i>la Souris tardive</i> , S. 24. | 24 |
| Souvenir du Concours, S. 13 | 15 |
| Späte Dauer, S. 6 | 8 |
| Standard, S. 6 | 8 |
| Standwell, S. 1 | 2 |
| <i>Sucrée de Brunswick</i> , S. 1. | 1 |
| de Suède, S. 28 | 28 |
| de Suisse dure farineuse, S. 19 | 19 |
| Sunrise, S. 5 | 6 |
| Surprise, S. 1 | 2 |
| Sutton's Berkshire kidney, S. 12. | 13 |
| <i>Sutton's early Race horse</i> , S. 10 | 12 |
| Sutton's early Regent potato, S. 26 | 26 |
| Sutton's Magnum bonum, S. 11 | 12 |
| Sutton's red skinned Flour ball (<i>Farineuse rouge</i>), S. 19 | 20 |
| <i>Suzel</i> , S. 11 | 12 |
| Sydowsauer, S. 2 | 4 |

| | Pages |
|--|-------|
| <i>de Table</i> , S. 23 | 23 |
| Tanguy, S. 2 | 4 |
| Tarbesienne (<i>D^r Cénas</i> , 1876), S. 2. | 4 |
| <i>Tarbesienne</i> (germes blancs) (<i>D^r Cénas</i> , 1876), S. 4. | 5 |
| Tardive d'Ascherleben, S. 19. | 20 |
| Tardive de Becker pour bestiaux, S. 5 | 6 |
| <i>Tardive de Bretagne</i> , S. 28 | 28 |
| Tardive de Pesca, S. 19 | 20 |
| <i>Tardive du Chili</i> , S. 28. | 28 |
| <i>la Taupe</i> , S. 24 | 24 |
| <i>Taylor's Yorkshire hybrid</i> , S. 11. | 12 |
| Terre, S. 28. | 28 |
| Thorburn's Paragon, S. 7. | 9 |
| Thurston's Conqueror, S. 11 | 12 |
| Tiftie's Annie, S. 27. | 27 |
| <i>Tige couchée</i> , S. 1 | 1 |
| Topinambour, S. 16 | 17 |
| Toute bonne, S. 18 | 19 |
| <i>Tricolore</i> , S. 18. | 19 |
| Triomphe de Lyon, S. 19. | 20 |
| Triumph, S. 19. | 20 |
| <i>de Trois mois</i> , S. 2. | 3 |
| Trophime, S. 6 | 7 |
| Trophy, S. 22. | 22 |
| Truffe d'août, S. 18 | 18 |
| Turner's Union, S. 1 | 1 |
| Tuttle's Excelsior, S. 24 | 24 |
| Unfehlbare, S. 6. | 8 |
| <i>Unwin's kidney</i> , S. 12 | 13 |
| <i>Uxlip seedling</i> , S. 12. | 13 |
| Valognaise, S. 24 | 24 |
| <i>de Valsère</i> , S. 2 | 3 |
| Van Acker, S. 30. | 30 |
| Van der Veer, S. 5. | 7 |
| <i>Vanéliane</i> , S. 24. | 24 |
| <i>de Varces</i> , S. 2 | 3 |
| <i>Veitch's ash leaf</i> , S. 13 | 14 |
| <i>Veitch's improved early ash-leaved kidney</i> , S. 13 | 14 |
| Vellez, S. 28 | 28 |
| Vendéenne noire, S. 29 | 29 |
| <i>Vendéenne violette</i> , S. 28 | 28 |

| | Pages |
|--|--------|
| Vermont Beauty. <i>Voy. Brownell's</i> , S. 23 | 23 |
| Vermont Champion, S. 8 | 10 |
| Veuve Anty, S. 18. | 19 |
| de Vevey, S. 19. | 20 |
| Vicar of Laleham, S. 29 | 29 |
| <i>Victoria Regent</i> , S. 3. | 5 |
| la Vierge (<i>J. Rigault</i> , 1883), S. 14 | 16 |
| la Vierge (<i>M. Sommelier</i> , 1840), S. 28 | 29 |
| <i>de Vigny</i> , S. 21 | 21 |
| <i>Vilmorin</i> , S. 11 | 12 |
| Vineuse, S. 22 | 23 |
| Violette (<i>M^{me} Vilmorin</i> , 1862), S. 27 | 26 |
| Violette (<i>Halle de Paris</i> , 1815), S. 28. | 28 |
| Violette (Strub) (<i>M. Strub</i> , 1872), S. 28. | 28 |
| Violette de Carignan, S. 14 | 16 |
| <i>Violette de Champagnole</i> , S. 28. | 28 |
| Violette de Grandchamp, S. 28 | 28 |
| <i>Violette de Lanilis</i> , S. 28 | 28 |
| Violette d'Islande. S. 29 | 29 |
| <i>Violette longue</i> , S. 30. | 30 |
| Violette marbrée de Caracas. S. 27 | 27 |
| Violette Rampal, S. 28. | 28 |
| la Virolle, S. 17. | 17 |
| Vitelotte à chair blanche. S. 24 | 24 |
| <i>Vitelotte belge</i> , S. 23 | 23 |
| <i>Vitelotte blanche</i> , S. 9 | 11 |
| Vitelotte d'Albany, S. 24 | 24 |
| Vitelotte jaune, S. 9 | 11 |
| Vitelotte lisse de la Halle, S. 21 | 22 |
| <i>des Vosges</i> , S. 6 | 7 |
| Vosgienne. <i>Voy. Jeancé</i> , S. 6 | 7 |
| Vosgienne (<i>M. Lecomte</i> , 1875), S. 28 | 28 |
| <i>Washington</i> , S. 19. | 20 |
| Waterloo kidney, S. 11 | 12 |
| Weather Bell, S. 14 | 16 |
| <i>Webb's Imperial</i> , S. 12 | 14 |
| <i>Weisse späte Rosen</i> , S. 13. | 15 |
| Weisser Sieberhäuser, S. 5. | 7 |
| Wellington, S. 26 | 25 |
| Wery, S. 19 | 19 |
| White blossomed, S. 22 | 23 |
| White Elephant, S. 7. | 10 |
| <i>White Emperor</i> , S. 1 | 1 |

LISTE ALPHABÉTIQUE.

51

| | Pages |
|--|-------|
| White Fortyfold, S. 6 | 8 |
| White Peach blow, S. 26. | 25 |
| <i>White pink</i> , S. 48 | 18 |
| White Star, S. 7. | 9 |
| Willard, S. 25. | 25 |
| Wiltshire Giant, S. 20 | 21 |
| Wiltshire Snowflake, S. 7 | 10 |
| <i>Wolff</i> , S. 21. | 21 |
| Wonderful red kidney (Kidney rouge hâtive), S. 20. | 21 |
| Wood's scarlet prolific, S. 49. | 20 |
| Woodstock kidney, S. 12 | 15 |
| <i>Woppet's seedling</i> , S. 12 | 13 |
| Wormleighton seedling, S. 8 | 10 |
| <i>Wormley kidney</i> , S. 12. | 14 |
| Xavier, S. 21. | 22 |
| Yam ou Ignose, S. 24 | 24 |
| <i>Yeux rouges</i> , S. 26. | 25 |
| <i>Yorkshire Hero</i> , S. 12 | 13 |
| Yorkshire Regent, S. 2. | 4 |
| de Zélande (<i>M. Gielen</i> , 1867), S. 48. | 19 |
| de Zélande (<i>M. Meissonnier</i> , 1848), S. 25.. . . . | 25 |
| de Zélande à fleur violette, S. 49 | 20 |

FIN

